

由南二高南下 334 公里，官田玉井下交流道，走 84 東西快速道路至玉井接台 20 線往楠西，過鹿陶洋右轉 188 號鄉道直達梅嶺風景區。

梅嶺，舊稱香蕉山，日據時代因種植香蕉聞名而著稱，後因外銷香蕉被菲律賓所取代，而改種梅樹。前副總統謝東閔先生於 1981 年更名為梅嶺。梅嶺是南瀛八景之一，亦是西拉雅風景區最佳觀光景點，現因受到鼎金國小車禍略有影響。但每年 12 月梅花吐蕊，滿山花海景觀在「嶺梅映雪」立碑見證下，是值得推薦旅遊的好去處。

登山步道有四條，由右至左為：①梅龍梅子雞餐廳；②觀音寺步道；③梅峰古道；④伍龍殿經土地公廟。

二層坪風景區標高 650 公尺，植物以梅樹為主要植物社會，主要古梅樹分布在觀音寺觀景台餐廳，有 120 及 98 年樹齡。文川古梅咖啡店旁荔枝胸寬 310 公分、高 15 公尺及對面蓮霧胸寬 284 公分、高 14 公尺，另外一株壯碩蘋婆胸寬 188 公分、高 8 公尺果樹，周遭以豔紫荊、小蝦花及樹蘭、平戶杜鵑、變葉木、尖尾鳳為綠籬行道樹，其他有肯氏南洋杉、蘭嶼羅漢松、台灣肖楠、榔榆、大葉楠、山櫻花、杏花、大花蔓陀蘿、大花紫薇、粉紅玉葉金花、錦屏粉藤、扶桑花、美人蕉、長穗鐵莧、石榴、鳳凰樹、粉撲花、珊瑚刺桐、水黃皮園藝花卉為主，伴隨龍眼、芒果、咖啡樹、仙桃、羊奶子等果樹。少見的落羽松及柿樹被柿寄生。

觀音寺登山口（765 公尺）至稜線鞍部產業道路（1045 公尺）植被以檳榔、山黃麻植物社會為主，前半段為梅樹產業道路，後半段森林登山小徑，坡度陡峭，有螞蝗出沒。喬木層植物以台灣雅楠最壯碩，其中一株還釘上「高市老爺隊」

鋁片。澀葉榕、竹頭角木薑子、五掌楠、香楠、大葉楠、樟、山香圓、朴樹、台灣栲、樟葉槭。灌木層步道上整群的假酸漿正在開花結果，其他有黑星紫金牛、玉山紫金牛、八仙花、咬人狗、銳葉山柑、頷垂豆、野桐、台灣杪欏、姑婆芋、長葉芋麻、台灣赤楠。地被植物，在梅樹下則是紫花藿香薊的天下，樹上則攀緣絨毛鐵線蓮及葛藤、崖薑蕨。其他以冷清草最大族群，長穗馬蘭、蛇根草、火炭母草僅次。同蕊草、黑果馬蛟兒、山鐸花、鳳仙花、中國穿鞘花、叢林杜若、傘穗弓果黍、咬人貓、台灣蛇莓、巒大秋海棠、烏來麻、昭和草等。藤本則以疏花魚藤、黃藤、串鼻龍、台灣山黑扁豆、玉葉金花為主。爬坡至整片刺柄碗蕨向陽處，桂竹開墾地帶，此時離觀日坪的稜線鞍部不遠。鞍部有步道路線圖可循稜線產業道路至梅峰、鷹嘴一線天、三腳南山等地。

鞍部至竹子尖山三角點（1109 公尺）植被以台灣矢竹與五節芒為社會，產業道路上種植梅樹與聖誕紅為主。循綁滿布條右上，路中央一株台灣栲胸寬 220 公分、高 10 公尺與攀附亨利氏伊立基藤形成拱門，上面標示歷史久遠的「腳印登山協會」鋁片，其他有三斗石櫟、后大埔石櫟、海舟常山、羅氏鹽膚木、粗糠柴、紅楠、芭蕉、中國柃木、台灣赤楠、野棉花、小舌菊、天草鳳尾蕨。三角點為二等，有一座自動氣象及雨量遙測系統無線中繼站。西方的景觀視線被台灣栲、小花鼠刺、細葉鰻頭果及台灣何首烏、南華南蛇藤緊密生長無法展望。

在三角點下坡處（1095 公尺），杜英、火焰木工寮休閒站，展望點極佳，近瞰二層坪風景區的紅屋綠蔭，西邊遙望七股鹽田、台灣海峽或注視綿延不斷的觀世音側身山形。日落時，欣賞嘉

南平原佳里、麻豆、楠西的七彩燈火夜景；北眺曾文水庫、東瞰南化水庫、南向玉楠盆地及阿拉溪斜瀑群。

三角點至梅龍餐廳，下坡路線前段森林以大葉楠、紅楠為植物社會，後段步道為檳榔、梅樹。雨季時，青苔水泥步道易滑且長滿咬人貓，下坡需小心。在無開墾闊葉林，三月份可見樟樹盛花，五掌楠、大葉楠、紅楠嫩芽展新葉。其他喬木有台灣雅楠（被鵝掌藤寄生）、巒大杉、野桐、白匏子、綠竹、蘋婆及芭蕉，矮灌木及草本植物有稜果榕、咬人狗、冇骨消、裡白刺楸、密花芋麻、台灣蘆竹、牛奶榕、鳳仙花、咬人貓、假毛蕨、刺柄碗蕨居多，偶見華他卡藤。

#### ◆崖薑蕨 *Pseudodry naria Coronas* (Mett.) Ching

為水龍骨科，種名 *coronans* 指葉著生像花冠狀，中名以植株生育狀根莖匍匐像薑形而名之。大型多年生常綠蕨類，根莖圓柱狀，橫走，密被棕色鱗片。葉無柄無關節，基部膨大，而上部較寬羽狀分裂，裂片全緣披針形。葉脈明顯而結合為網狀網脈，有單一或分叉的內藏小脈。孢子囊圓形，無苞膜，著生在主脈的兩側。分布印度、中國、台灣。生長在低海拔的樹幹或岩石上。通常以著生方式，將長走莖環繞樹幹一圈，並利用特化膨大葉柄基部可收集雨水、灰塵、落葉成腐植質的養分。與山蘇花(*Asplenium antiquum*)及懈蕨 (*Drynaria fortunei*)習性相似。植株懸垂性可供觀賞或花材利用。

#### ◆紅楠 *Machilus thunbergii* Sieber et Zuccarini

樟科，原屬名 *Persea* 為生甘味之樹木，1962年 G. H. Kostermans 氏擴大將 *Alscodaphne* 西疇楠屬、*Nothaphoebe* 大果楠屬及 *Machilus* 禎楠屬合併而成。種名 *thunbergii* 是瑞典人 Carl Pehr Thunberg 生於 1743-1828 年，中文因嫩葉紅色而稱紅楠或鱗芽交互排列，遠觀如紅燒豬腳而稱豬腳楠；另砍伐植株，會有黏液流出，而稱鼻涕楠。

常綠喬木，小枝有皮孔，鱗芽苞與新葉呈嫩紅色，老葉深綠色。葉互生，厚革質，葉表光滑，葉背粉白常為橢圓狀披針形。花兩性，聚繖狀圓錐花序，花小黃白色，盛開 4-5 月。花被 6 枚，雄蕊 12 枚，排成 4 輪，可孕雄蕊 9 枚。核果球形，成熟時呈紫黑色，果梗呈紅色，花被片宿存，反捲。分布南韓、日本、琉球、中國、台灣海拔 200-1800 公尺闊葉林。海岸防風、庭園美化、景觀樹種。嫩葉是青帶鳳蝶的食草。種子可榨油，樹皮含黏液，可作線香材料或供褐色染料，木材在雅美族人是一種禁忌的柴薪，燒陶會有不祥劈拍聲。木材黃白至紅褐色，生長年輪明顯易乾燥，少反翹，硬度中庸適宜當船艦、車輛、農具、雕刻。在台北市百福里成福路 276 號有 62 年老樹；而台北縣金山鄉三界村法鼓山有鎮寺樹王。



#### ◆柿寄生 *Viscum diospyrosicolum* Hayata

桑寄生科，屬名 *Viscum* 為拉丁語的 *viscum* 捕鳥黏劑一語衍用。寄生小灌木，小枝瘦細，2 叉或 3 叉分歧，節間扁平，呈縱稜 2-3 條。嫩枝有葉，但經常退化不存。雌雄異花，花小型，雄花總苞呈杯狀；花被 4 裂，雄蕊 4 枚，花藥 5-6 室，著生於花被片中央。雌花著生節間兩側，單立，總苞呈三角狀，花被 2 裂，邊緣有細齒。漿果橢圓形，黃色，會分泌黏液。花期 5-9 月，果期 9-12 月。分布亞洲、澳洲、台灣中低海拔闊葉林。最主要寄主為柿樹，其他有樟樹、梨樹、油

桐、柳、榆、桑或殼斗科、薔薇科等植物體上。另外常見稠欖柿寄生 (*V. liquidambar icolum*) 差異在節間纖細，有縱稜 5-7 條。全株可藥用，並有舒筋、消炎之功效。

◆ 锈毛鐵線蓮 *Clematis leschenaultiana* DC.

為毛茛科，屬名 *Clematis* 自希臘語的 *klema* (卷鬚，蔓) 一語而來。種名 *leschenaultiana* 為法國人氏名，生於 1773-1826 年。中名「鐵線」是指蔓莖又細又硬的植株。多年生藤本，全株被金黃色絨毛。葉對生，三出複葉，葉片卵形，呈三出脈，披絨毛，粗鋸齒緣。聚繖花序腋生，3 朵黃白色，鐘形。花被片 4 枚，無花瓣構造，雄蕊多數，花藥線形。瘦果為紡錘形，具 2 稜，宿存花柱柔毛狀。花果期 1-3 月。分布印度、菲律賓、蘇門答臘、爪哇、摩鹿加、中國、台灣低海拔灌叢。栽植藤架欣賞花姿，粗壯蔓莖，具有活血通絡、通乳、通經之藥效，又稱毛木通。



锈毛鐵線蓮

◆ 黑眼花 *Thunbergia alata* Bojerex Sims.

爵床科，屬名 *Thunbergia* 為紀念瑞典博物學者 *Karl Peter Thunberg* 人氏名，生於 1743-1828 年，種名 *alata* 指葉柄有翼狀，且花形如鄧伯花，又叫翼柄鄧伯花、翼葉老鴉嘴。中名因黃花而喉部中心著生黑紫色圓斑而名之，或俗稱黃花山牽牛。蔓性草本，莖細長，密生短毛。葉對生，葉柄具有狹翼，葉片為三角狀卵形，葉緣有鋸齒、稍波狀。花單出腋生，具苞葉 2 枚。花冠筒狀鐘



黑眼花

形，5 裂呈橙黃色，中央喉部黑紫色。花期春末至秋季。雄蕊 4 枚，柱頭 2 枚。蒴果卵球形，3 瓣裂，種子 3-6 枚。分布熱帶非洲，1910 年由藤根吉春氏從新加坡引進。因氣候適合已馴化自生，台灣低海拔常見，在梅嶺雜草堆，經常看到結實能力強，適應乾旱炎熱，擴張快速的蔓藤。同屬不同種的橙花白眼品種又稱白眼花。可當盆栽或綠廊造景。

◆ 紫花藿香薷 *Ageratum houstonianum* Mill.

菊科，屬名 *Ageratum* 為 *a* (否定語) 與 *geras* (老年) 二語組成，指花色隨時間不易變化。種名 *houstonianum* 是人氏名，生於 1695-1977 年。中名以花株性狀顏色而命名，又稱紫花毛麝香、墨西哥藍薷。一年生草本，全株被白色長柔毛，葉對生，葉卵形，鈍鋸齒緣，含有香味。頭狀花排列成繖房狀，全由管狀花組成，花冠外側有腺毛，先端 5 裂，聚藥雄蕊 5 枚，瘦果圓柱形有 4 稜。



紫花藿香薷

另一種白花藿香薊則是 5 稜，附有白色冠毛。分布墨西哥、秘魯，1911 年日本人引進台灣，作為觀賞草花。目前大量歸化全省平野及低海拔地區。在休耕農田形成紫色雜草帶，如同北海道花海。全株含有精油，可利咽喉消腫，惟含有微量氫氰酸，食用時需注意。2001 年，台中縣清水鎮發現了散播力、繁殖力更強的貓腥草（*Praxelis clematidea*）入侵紫花藿香薊地盤。貓腥草花梗 3 分支，每分支長 2-4 枚小花，每個花梗約 6-8 朵紫色小花，而紫花藿香薊則是 10-16 朵紫色小花。吊盆、庭植作觀賞、切花及蜜源植物。全草搗爛敷治蛇傷、感冒發熱，惟誤食過量易造成小腸充血或急性腸黏膜疾病。

◆小舌菊 *Microglossa pyrifolia* (Lam.) O. Kuntze

菊科，屬名 *Microglossa* 意指花冠為小舌狀，種



小舌菊

名 *pyrifolia* 指葉像梨屬的葉片。多年生木質蔓性草本。葉對生，卵狀披針形，小鋸

齒緣或全緣。頭狀花小，呈繖房狀，淡黃色，冠端 4 裂。具總苞片膜質，呈 3-4 輪。頭狀花冠周圍雌性舌狀花 8 枚，中央為兩性管狀花 4 枚。瘦果細長扁平，略成 5 角柱狀，附帶冠毛。分布馬來西亞、印度、非洲、台灣低海拔向陽開闊地。攀緣蔓性，可作造景綠籬，惟種子帶冠毛，散播快防制不易。因族群蔓延又稱蔓綿菜、蔓山地黃菊。枝葉煮沸沐浴治皮膚癢。

◆中國穿鞘花 *Amischotolype hispida* (Less. & Rich.) Hong  
鴨跖草科，產地中國雲南，花自葉腋萌生，而有穿鞘花之名，因結果狀似薑而俗稱山薑荷、東陵草。多年生草本，基部平臥，光滑，葉莖匍

匍，上部直立。葉叢生於莖的上半部，倒披針形，大型可達 23 公分長，呈管狀包住莖部，被柔花，平行脈，波狀緣。聚繖花序，於夏、秋季開花，從葉腋間盛開。白花、萼瓣皆 3 枚，雄蕊 6 枚，花絲有鬚毛。蒴果 3 室，成熟後開裂，種子具橘紅色肉質假種皮。分布中國雲南、廣東、沖繩、台灣全島陰濕的森林底層。假種皮果實適合庭院觀賞、花材、綠化。全草用火烤成半乾纏繞，治腰部疼痛。

◆台灣矢竹 *Arundinaria kumishii* Hayata

禾本科，中文名因竹材利用而命名，通稱為箭竹。根莖匍匐，屬低矮灌木，地下莖側出合軸叢生。稈之節無毛，隆起，每節具 1-3 側枝，稈籜革質，密佈棕色細毛，邊緣無毛；籜耳細小，上端有剛毛。籜舌截形。葉 1-3 枚成一簇，披針狀橢圓形，具 7-9 條側脈葉緣，無毛，葉耳不顯著，葉舌圓突；葉下表面有粒狀突起。分布台灣海拔 300-1200 公尺山區，梅嶺竹子尖山的山頭有大面積叢生，尾寮山登山口 500 公尺處有覆蓋綠化水土保持。是常見台灣細竹斑蛾的食草。筍以水煮去苦味可食用。在清明節前後為盛產期，花蓮太巴壠、馬太鞍部落推廣箭竹筍之旅，矢竹可編織器物、牆壁、圍籬，甚至鼻笛、煙管。台灣另一種常見包籜矢竹 (*A. usawai*) 稈之節有金褐色毛茸，葉下表面細脈無突起。

#### 梅峰縱走一線天·植物觀察

日期：5 月 20 日（日） 解說：凌明裕 鳥友

集合：8：30 於大眾餐廳停車場集合（南二高下新化交流道，沿 20 號省道往玉井、楠西方向，到楠西之後右轉南 188 號鄉道到達梅嶺風景區，循沿途指標或於 9 公里處左轉，即可到達大眾餐廳）

備註：交通、保險自理，請自備飲水、點心，並盡量穿著登山鞋、背登山杖。