

# 雁鴨科鳥類辨識

## 小撇步

整理／楊玉祥

台灣的雁鴨之中(根據中華鳥會新頒 2008 台灣鳥類名錄)，大多數都以雄鳥十分帥氣，雌鳥則非常樸素著稱，最有名的莫過於鴛鴦(Mandarin Duck, *Aix galericulata*)了，其公鳥更是艷冠群「芳」啊！雖然大部分的雁鴨在台灣是屬於冬候鳥，卻有很大的機會見到公鳥的夏羽，因此除了可以依其外觀加以辨識外，更要好好地欣賞一下牠們的英姿，至於很容易互相混淆的雄鳥冬羽與眾家鴨媽媽們，就必須仔細比對圖鑑上的差異，此外，還可以觀察牠們究竟都跟著哪些公鳥，在辨認上也是一個訣竅。以下是較常見的雁鴨雄鳥辨識方法整理。

### ◆大型，身體全白的天鵝：

鳥種	外觀特徵	生態習性
黃嘴天鵝	體型介於瘤鵝和鵞之間。嘴喙黃色部分延伸至鼻孔下前方	迷鳥，出現於河口、沙洲、湖泊等地帶
鵞 小天鵝	體型較小，嘴喙黃色只到鼻孔後方	



小天鵝 (李俊輝 攝)

### ◆大型，身體暗褐色有淡色羽緣形成許多花紋，尾下覆羽白色，看似家鵝：

鳥種	外觀特徵	生態習性
灰雁	體灰褐色，嘴、腳粉紅色	家鵝即是由鴻雁馴化而來
白額雁	嘴粉紅色、先端白色，額、嘴基周圍白色	
小白額雁	體型小，嘴粉紅色，嘴基、額白色，延伸近頭頂，眼圈金色	
鴻雁	嘴全黑，基部有白色細環，頭上部至後頸茶褐色，前頸及頸側淡色	
豆雁	嘴黑色，近先端處有一橙色部位，頭至頸褐色有白色細紋	



小白額雁 (鄭政卿 攝)



豆雁 (柯木村 攝)

### ◆中型，頭部暗綠色：

鳥種	外觀特徵	生態習性
琵嘴鴨	體型較小，嘴黑色、大而寬扁，胸白色，下胸至腹、脇栗褐色十分明顯	通常大群，可達千隻以上的數量
花鳧	體型較大，嘴紅色，身體大致白色，肩羽黑色，胸至背有褐色、看似穿著「吊帶褲」般的胸環	稀有冬候鳥或過境鳥，通常單獨或成對出現



琵嘴鴨♀ (王健得 攝)

鳥種	外觀特徵	生態習性
綠頭鴨	體型近花鳧，嘴黃色，頸有一白色細頸環，胸暗褐色，背、脇灰色，尾上覆羽倒捲	稀有冬候鳥，單獨或小群出現，人為繁殖數量多
鵝鴨	體型較小，嘴黑色，眼金黃色，眼下方有一白色圓斑甚明顯。背至尾羽黑色，翼白色有數條黑色細線，頸以下白色	



鵝鴨 (李俊輝 攝)

◆中、小型，臉上有綠色斑塊：

鳥種	外觀特徵	生態習性
小水鴨	體型最小，頭栗褐色，眼周圍有大塊綠色，邊緣白色，尾下覆羽黑色，有黃色三角形斑	普遍常見冬候鳥，數量可達百隻或千隻以上
羅文鴨	體型大，頭上至後頸暗褐色，眼至後頸有大塊綠色，額白色。三級飛羽甚長向下捲，尾下覆羽黑色，有黃色三角形斑	稀有過境鳥，小群出現
巴鴨	體型比小水鴨略大，頭上至後頸黑褐色，臉上有大型二塊黃色及一塊綠色斑塊，綠色斑主要在耳羽附近，各色塊邊緣黑色或白色	稀有過境鳥，單獨或小群出現



小水鴨 (鄭政卿 攝)



羅文鴨 (蘇貴福 攝)

◆中、小型，頭紅色：

鳥種	外觀特徵	生態習性
赤頸鴨	頭栗褐色，額乳黃色，胸粉紅色，全身大致灰色有細紋，體側有一明顯白斑	不潛水
紅頭潛鴨 磯雁	頭栗紅色，眼紅色，胸黑色，背灰色有細紋，脇淡灰色	會潛入水中



赤頸鴨 (王健得 攝)

◆中型，身體大致黑、白對比：

鳥種	外觀特徵	生態習性
鳳頭潛鴨 澤鳧	體型略小，後頭有飾羽，背黑色。冬羽全身暗褐色，腹、脇較淡色，雌鳥冬羽嘴基偶有小白斑	普遍常見，數量可達數百到千隻以上
斑背潛鴨 鈴鴨	體型略大，後頭無飾羽，背白色，有暗色細紋。雄鳥冬羽背、脇灰色有細紋；雌鳥冬羽全身暗褐色，嘴基有大塊白斑，兩側上方相連成馬鞍型	通常單獨或小群混於鳳頭潛鴨中



鳳頭潛鴨 (鄭政卿 攝)

◆秋沙，體扁平，游泳時，尾羽幾乎平貼水面，善潛水捕魚

鳥種	外觀特徵
白秋沙	全身大致為白色，嘴至眼先、肩羽、尾羽黑色
紅胸秋沙 海秋沙	頭暗綠色延伸至頸後，後頭有上下兩簇冠羽，眼紅色，嘴紅色，先端勾，前頸至頸側白色，背中央黑色、兩側灰色，覆羽白色
川秋沙	頭暗綠色無冠羽，嘴紅色，先端勾，身上大致白色，背中央黑色，尾上覆羽及尾羽灰色
唐秋沙	頭暗綠色，後頭有一簇長冠羽，嘴紅色，先端勾，全身大致白色，背黑色，胸側、脇有暗色鱗狀斑，尾上覆羽、尾羽灰色有鱗斑



川秋沙♀ (李俊輝 攝)



尖尾鴨 (王健得 攝)



花嘴鴨 (王健得 攝)



濱靚 (鄭政卿 攝)

◆其他：

鳥種	外觀特徵	生態習性
尖尾鴨	頭巧克力色、頭側有一道白線延伸至前頸，尾羽甚尖長，頸部較長，游泳時常直挺	常將頭往下伸入水中覓食，只露出尾部在水面上
濱靚	全身黃褐色、頭部較淡，雌鳥臉部更為淡色，雄鳥有黑色頸圈	
鴛鴦	雄鳥羽色十分鮮艷亮麗，臉頰、體側及上翹的三級飛羽為顯眼的橙色，頭上藍綠色，羽冠長、紫色，眉線寬大、白色	稀有留鳥，棲息於中、低海拔山區，少數過境鳥
花嘴鴨	嘴黑色、先端黃色	普遍常見冬候鳥，少數為留鳥
白眉鴨	頭至頸栗褐色、眉線白色寬長明顯	
赤膀鴨	頭灰褐色，過眼線細、黑褐色，肩羽長，紅褐色	

◆鴛鴦 Mandarin Duck, *Aix galericulata* • L45cm

雄鳥嘴橙紅色、先端白色，腳橙黃色。臉頰、體側及上翹的三級飛羽為顯眼的橙色，頭上藍綠色，羽冠長、紫色，眉線寬大、白色，下頸至胸、背部紫褐色並有黑色邊緣，腹以下至尾下覆羽白色。雌鳥(嘴黑)及雄鳥冬羽(嘴淡橙紅)，全身大致暗灰褐色，體側有灰白色斑點，眼圈及細長的眼後線為白色，十分明顯。是十分稀有的留鳥或過境、冬候鳥，繁殖族群棲息於中、低海拔山區溪澗，過境鳥則出現於河口及沙洲地帶。

◆尖尾鴨 Northern Pintail, *Anas acuta* • L♂75cm ♀53cm

雄鳥嘴鉛色、中央黑色，夏羽頭巧克力色、頭側有一道白線延伸至前頸，體大致灰色有細紋，肩羽長、黑色有白邊，尾上、下覆羽黑色，尾下兩側黃色，中央尾羽黑色甚長。雌鳥嘴黑色，全身褐色有黑褐色斑。普遍常見的冬候鳥，出現於河口、沙洲、沼澤地帶，數量可以達到上百隻。

◆琵嘴鴨 Northern Shoveler, *Anas clypeata* • L50cm

嘴型大而扁平，呈匙狀，腳橙紅色。雄鳥夏羽嘴黑色，頭至頸暗綠色而有光澤，背部黑色，胸



白色，下胸至腹、脇栗褐色十分明顯，尾上、尾下覆羽黑色，尾羽白色。雌鳥嘴橙黃色，全身褐色，羽緣有淡色寬邊。普遍常見的冬候鳥，出現於河口、沙洲、湖泊等地。

◆小水鴨 Green-winged Teal, *Anas crecca* • L38cm

嘴、腳黑色。雄鳥夏羽頭栗褐色，眼周圍暗綠色延伸至頭後、外緣有淡色細邊。胸淡褐色，有暗色細斑，背、脇灰色有暗色細紋，體側有一條明顯白線，尾下覆羽黑色、兩側有黃色三角形斑。雌鳥全身暗褐色，羽緣有淡色細邊，過眼線黑色。為普遍常見的冬候鳥，出現於河口、沙洲、湖泊等地帶。

◆羅文鴨 Falcated Teal, *Anas falcata* • L48cm

嘴、腳灰黑色。頭上至後頸暗褐色，眼至後頸有大塊綠色，額白色，頸有黑色及白色頸圈，全身灰白色，有暗色細紋，三級飛羽甚長，並向下捲，尾下覆羽黑色，兩側有黃色三角形斑。稀有過境鳥，通常單獨或小群出現。

◆巴鴨 Baikal Teal, *Anas formosa* • L40cm

嘴、腳黑色。雄鳥夏羽頭頂褐色，臉有大型黃、綠色斑塊，背灰褐色，肩羽黑褐色甚長，胸黃褐色有暗色細斑，脇灰色，尾下覆羽黑色。雌鳥全身大致暗褐色，羽緣褐色，臉、頰有黑褐色斑紋，嘴基部有白色圓斑。稀有的過境鳥，出現於河口、沙洲、湖泊等地帶。

◆赤頸鴨 Eurasian Wigeon, *Anas penelope* • L50cm

嘴鉛色，先端黑色，腳黑色。雄鳥夏羽頭至頸栗褐色，額至頭頂乳黃色，胸粉紅色，背、胸灰色，覆羽、下腹部白色，尾下覆羽黑色，尾羽淡色。普遍常見的冬候鳥，出現於河口、沙洲、沼澤地帶，數量常可以達到上百隻。

◆綠頭鴨 Mallard, *Anas platyrhynchos* • L59cm

雄鳥嘴黃色、腳橙紅色。頭至上頸暗綠色有光澤，下有一白色細頸圈，胸暗褐色，覆、體側灰

色，腰至尾上覆羽、尾下覆羽黑色，尾上覆羽向上捲，尾羽白色。雌鳥嘴橙黃色、上嘴有黑斑，過眼線細、暗褐色或黑色，全身大致黃褐色有黑褐色鱗斑。不普遍的冬候鳥，常單獨至小群出現於河口、海岸附近的沼澤、沙洲，但是人工繁殖數量甚多。

◆花嘴鴨 Spot-billed Duck, *Anas poecilorhyncha* • L60cm

雌、雄同型。嘴黑色、先端黃色、腳橙紅色，頭至頸部淡褐色，眉白色，過眼線黑色，嘴基有一道黑線至眼下方，全身大致上暗灰褐色、羽緣有淡色細邊。為普遍的冬候鳥，出現於湖泊、河口、沙洲等地帶，部分為留鳥，東部較多，墾丁龍鑾潭周邊地區亦有繁殖。

◆白眉鴨 Garganey, *Anas querquedula* • L38cm

嘴、腳黑色。雄鳥夏羽頭至頸栗褐色、眉線白色寬長明顯，肩有黑、白色長羽，胸褐色，脇灰色，全身有細斑。雌鳥全身大致暗褐色，羽緣淡色，眉斑白色，嘴基有白色圓斑、往後延伸至過眼線下。為不普遍的過境鳥或冬候鳥，出現於河口、沙洲、湖泊等地帶。



白眉鴨（李俊輝 攝）

◆赤膀鴨 Gadwall, *Anas strepera* • L50cm

雄鳥嘴黑色，腳橙黃色，全身大致灰色有細紋，臉部至前頸顏色較淡，肩羽甚長、紅褐色，三級飛羽內側白色，尾上、下覆羽黑色，尾羽淡色。雌鳥嘴中央黑色，周邊橙黃色，全身大致黃褐色有黑褐色鱗斑。稀有的過境鳥，單獨或小群出現於河口、沙洲、沼澤地帶。

◆白額雁 Greater White-fronted Goose, *Anser albifrons* • L72cm

嘴粉紅色，先端白色，腳橙黃色。額、嘴基周圍白色，體灰褐色、腹面較淡、羽緣淡色，腹部有數條黑橫紋，尾下覆羽白色。

◆灰雁 Greylag Goose, *Anser anser* · L76cm

嘴、腳粉紅色，體灰褐色、羽緣白色，腹面羽色較淡，尾上、下覆羽白色。迷鳥

◆鴻雁 Swan Goose, *Anser cygnoides* · L87cm

嘴黑色，基部有白色細環，腳橙黃色。頭上半部至後頸褐色，前頸白色，背面暗褐色、羽緣淡色，腹面淡褐色有細橫紋，尾下覆羽白色。稀有過境鳥，出現於河口、農田地帶。

◆小白額雁 Lesser White-fronted Goose, *Anser erythropus* · L59cm

嘴粉紅色，腳橙黃色。額、嘴基周圍白色並延伸近頭頂，體灰褐色、腹面較淡、羽緣淡色，腹部有數條黑橫紋，尾下覆羽白色。

◆豆雁 Bean Goose, *Anser fabalis* · L85cm

嘴黑色，近先端有一橙色斑，腳橙黃色。頭至頸暗褐色、有淡色細紋，背部暗褐色、羽緣淡色，腹面淡色有細橫紋，尾下覆羽白色。稀有過境鳥，小群出現於河口、農田、湖泊。

◆紅頭潛鴨／磯雁 Common Pochard, *Aythya ferina* · L45cm

嘴鉛色、周邊黑色，腳灰黑色。雄鳥夏羽頭至頸部栗紅色、眼紅色，身體大致灰色、背有暗色細斑，胸、尾上及尾下覆羽黑色。雌鳥頭至前頸淡褐色，身體上羽色較暗。不普遍冬候鳥，小群出現於湖泊、魚塭，數量偶而可達數十至百隻。

◆鳳頭潛鴨／澤鳧 Tufted Duck, *Aythya fuligula* · L40cm

嘴鉛色，先端黑色，腳灰黑色，眼黃色。雄鳥夏羽頭至頸黑紫色有光澤、有冠羽，背面、胸、尾上、下覆羽黑色，腹、脇白色。雌鳥全身暗褐色，腹、脇羽色較淡、有褐色斑紋，有些個體嘴基部有白色斑紋。普遍的冬候鳥，常大群出現於湖泊、魚塭，數量可達上百隻或千隻以上。

◆斑背潛鴨／鈴鴨 Greater Scaup, *Aythya marila* · L45cm

嘴鉛色，先端黑色，腳黑色，眼黃色。雄鳥夏羽頭至頸黑綠色有光澤，背白色，有暗色細紋，胸、尾上、下覆羽黑色，腹、脇白色。雄鳥全身

大致暗褐色，嘴基部有大塊白色斑紋，兩側上方相連成鞍形。不普遍冬候鳥，小群出現於湖泊、魚塭，常混於鳳頭潛鴨群中。

◆鵞鴨 Common Goldeneye, *Bucephala clangula* · L45cm

嘴黑色，腳橙色。雄鳥夏羽頭暗色有光澤、頭頂及後頭隆起狀、眼金黃色、眼下有大塊白色圓斑，背至尾羽黑色，翼白色有數條黑色細線，頸以下白色。雌鳥嘴先端橙色，頭部暗褐色，身上大致灰黑色、羽緣淡色，白色頸環。迷鳥。

◆小天鵝 Tundra Swan, *Cygnus columbianus* · L120cm

眼先至上嘴基部黃色、延伸至鼻孔後方，鼻孔至上嘴先端及下嘴黑色，腳黑色，全身大致白色。迷鳥，出現於河口、沙洲、湖泊...等地。

◆黃嘴天鵝 Whooper Swan, *Cygnus cygnus* · L140cm

眼先至上嘴基部黃色、延伸至鼻孔下前方，上嘴先端及下嘴黑色，腳黑色，全身大致白色。迷鳥，出現於河口、沙洲、湖泊...等地。

◆白秋沙 Smew, *Mergellus albellus* · L42cm

雄鳥夏羽全身大致為白色，嘴略短、灰色，腳灰色，眼周圍灰黑色，後頭有冠羽，背中央黑色、兩側白色，腰至尾羽灰黑色，胸側、翼有黑線。雌鳥額、頭頂至後頸褐色，身上大致灰色。迷鳥。

◆川秋沙 Common Merganser, *Mergus merganser* · L65cm

嘴細長、先端勾、紅色，頭暗綠色無冠羽，身上大致白色，背中央黑色，尾上覆羽及尾羽灰色。雌鳥頭至頸褐色，額白色，前胸白色，身上大致灰色。

◆海秋沙 Red-breasted Merganser, *Mergus serrator* · L55cm

嘴細長、先端勾、紅色，眼紅色，頭暗綠色延伸至頸後，後頭上下有兩簇冠羽，背中黑色、外側灰色，翼白色，飛羽黑色，前頸白色，上胸褐色有暗色斑點，胸白色有黑縱斑，脇灰色有細斑，尾上、下覆羽、尾羽灰色。雌鳥頭至頸褐

色，冠羽較短，額至前胸白色，身體大致灰色。迷鳥。

◆唐秋沙 Scaly-sided Merganser, *Mergus squamatus* · L55cm

嘴細長、先端勾、紅色，頭暗綠色，後頭有一簇長冠羽，全身大致白色，背黑色，胸側、脇有暗色鱗狀斑，尾上覆羽、尾羽灰色有鱗斑。雌鳥頭至頸為暗褐色、有冠羽，背至尾羽灰色，前頸、脇污白色有鱗斑。

◆瀆鳧 Ruddy Shelduck, *Tadorna ferruginea* · L63cm

嘴、腳黑色。全身黃褐色、頭部顏色較淡，雌

鳥臉部更為淡色，雄鳥有黑色頸圈，飛羽、尾羽黑色，翼鏡墨綠色，飛行時可見翼上、翼下覆羽白色，與翼鏡對比明顯。是十分稀有的冬候鳥或過境鳥，出現於河口、沙洲、湖泊...等地帶。

◆花鳧 Common Shelduck, *Tadorna tadorna* · L62cm

嘴紅色、雄鳥上嘴基部有瘤狀突起，腳粉紅色。頭至頸暗綠色，身體大部分白色、胸側至背有栗褐色的寬帶，肩羽及尾羽的末端黑色，腹部中央有黑縱帶。是十分稀有的冬候鳥或過境鳥，單獨或成對出現於河口、沙洲、湖泊...等地。

台灣鄉土鳥類名介紹 (四)

資料整理／辛啓昭

中文/鄉土名	每窩生蛋數、繁殖期與特徵	習性敘述
環頸雉 啼雞	每窩生蛋數 6-8 枚，蛋為淡粉紅色，每年 4-6 月為繁殖期，築巢以芒草之葉、莖、根為材，鋪成淺窩狀。雄鳥羽毛色彩繽紛、臉紅，並有雄赳赳之氣勢。	為台灣特有亞種，屬留鳥。雄鳥頭下有白色頸圈而得名。雄鳥尾長達 40 公分，雌鳥較短，平時潛伏草間覓食，屬雜食性。地震發生前，會有敏感預警的鳴叫動作。
灰面鵟鷹 灰面鷲 國慶鳥 南路鷹	主要繁殖地：大陸東北、日本、朝鮮半島等。每年十月十日左右過境台灣至南洋過冬，故國人稱牠為「國慶鳥」，又因總是落腳屏東滿州後山，當地人稱牠為「山後鳥」。每年春、秋兩季南遷、北徙，是屬典型的過境鳥。	每年三月清明節前後，成群由南而北至彰化八卦山、大肚山附近歇腳，因由南路而來，彰化人稱為「南路鷹」，又剛好接近清明節，故又有「掃墓鳥」之稱。「南路鷹一萬死九千」為過境台灣悲慘命運的順口溜，希望您我一起加入生態保育，除此惡名。以蛙、昆蟲、老鼠、小鳥為主食。
番鵝 草囑	每窩生蛋數 2-3 枚，蛋白色無斑，每年 4-7 月為繁殖期，築巢於離地一公尺之叢林裡，以植物的葉、莖、根為材料。空曠地帶、溪埔常成對低飛與「叩、叩-」鳴叫。杜鵑科中難得的鳥種，自己會營巢孵蛋育雛。	台灣普遍鳥種，栗褐色的背羽是最佳的保護色，若不加以注意，常誤以為是乾枯的草葉，再加上鳴聲似「囑、囑、囑」，鄉下地區稱牠為「草囑」。冬季背羽栗褐色，夏季全身大致黑色略帶光澤，羽色差異很大。以昆蟲為主食。
白頭翁 白頭殼仔	每窩生蛋數 3-4 枚，蛋灰白色，有紫褐色斑點。每年 4-8 月為繁殖期，築巢於離地 2-3 公尺之樹上。以枯草、細枝及芒草穗為材，呈杯形巢。繁殖期成雙成對，鳴叫聲音多變，故有「愛吃果子、愛吹口哨」之稱。	為台灣特有亞種，屬留鳥。因頭頂彷彿帶著白色瓜皮帽，故得名為「白頭殼仔」。與烏頭翁長得像親戚，有領域性區分。白頭翁：台灣西半部；烏頭翁：台東、花蓮和恆春半島。以昆蟲、果實為主食。
藍磯鶉 厝角鳥	主要繁殖地：中國大陸東北、朝鮮。7-8 月在野柳東北角濱海公路附近，曾有哺育幼鳥之記錄。巢呈杯狀，築於裂開岩壁及建築物的洞中，以草莖和枯樹根為建築材料。雄鳥喜歡立於突出物上鳴唱，鳴聲尖細似笛聲。	常單獨棲於屋頂之厝角而得名。喜佇立於突出的厝角、木樁或岩石上，不停的點頭視察，故又有「點頭鳥」之稱。雄鳥有一身亮麗耀眼的深藍色背羽，栗紅色的腹羽；雌鳥灰藍色，腹部有黑褐色斑紋。每年 9 月來臨，次年 5 月離開，屬冬候鳥。

參考文獻：鳥與史料／周鎮。水鳥、陸鳥／張萬福。台灣野鳥圖鑑