

伯勞科 *Laniidae* 鳥類辨識

小撇步

整理／楊玉祥

伯勞科 *Laniidae*(Vieillot, 1808)屬於鳥綱雀形目，根據台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類記錄委員會, 2011)，台灣總共有 6 種伯勞科鳥種之記錄。在 6 種伯勞當中，僅有棕背伯勞 (*Lanius schach*)為普遍的留鳥；紅尾伯勞(*Lanius cristatus*)是最多的伯勞，為普遍的冬候鳥及過境鳥；紅頭伯勞(*Lanius bucephalus*)為稀有冬候鳥，



虎紋伯勞(*Lanius tigrinus*)為稀有過境鳥；楔尾伯勞 (*Lanius sphenocercus*) 與 紅背伯勞 (*Lanius collurio*)則為迷鳥。

伯勞科型態特徵為：嘴型大而強，側扁，尖端鉤曲，有缺刻(高璋 1995，鳥類分類學)。伯勞科成員均為肉食性，以昆蟲、蠕蟲...等無脊椎動物以及蛙類、蜥蜴、蛇或小型鳥類、哺乳類等為食。伯勞科鳥類有「儲食」的習性，牠們會把吃剩的獵物殘骸穿刺、懸吊在枝椏間或其它突出物上，用以儲存，並常常回來取食。

以下是分享一些野外辨識伯勞科鳥種的方式，供鳥友們參考，建議可先依體型去區分，然後再依背部體色或斑紋來加以辨識。

←紅尾伯勞·李文化 攝

種類	辨識特徵	備註
體型小，體長約 18 公分		
紅尾伯勞 <i>Lanius cristatus</i> • Brown Shrike	<ul style="list-style-type: none"> 額、頭頂至背面為一致的紅褐色。 保育類鳥種 	冬候鳥及過境鳥
紅背伯勞 <i>Lanius collurio</i> • Red-backed Shrike	<ul style="list-style-type: none"> 頭灰色、<u>背紅色</u>，尾羽黑色、近端 1/3 外側尾羽白色。 	迷鳥
紅頭伯勞／牛頭伯勞 <i>Lanius bucephalus</i> • Bull-headed Shrike	<ul style="list-style-type: none"> <u>頭紅色</u>、背灰色。 飛行時，飛羽黑色有小塊白斑。 	稀有冬候鳥
虎紋伯勞 <i>Lanius tigrinus</i> • Tiger Shrike	<ul style="list-style-type: none"> 頭灰色、<u>背紅色、密布橫紋</u>。 腹面甚白。 	稀有過境鳥
體型大，體長約 25 公分		
棕背伯勞 <i>Lanius schach</i> • Long-tailed Shrike	<ul style="list-style-type: none"> 頭至後頸灰色，<u>背至腰紅褐色</u>，尾黑色。 過眼線甚粗黑，飛行時翼黑色有白斑。 	留鳥
體型最大型，體長約 30 公分		
楔尾伯勞／長尾灰伯勞 <i>Lanius sphenocercus</i> • Chinese Gray Shrike	<ul style="list-style-type: none"> 背灰色，翼黑色有白色翼帶。 有空中心定點振翅的行為。 	最大型迷鳥