

# 雉科 鳥類辨識小撇步

整理／楊玉祥

雉科(Phasianidae)為雞形目(Galliformes)底下唯一有分布於台灣的科別，Galliformes的原文Gallus是指公雞。台灣目前有7種雉科鳥類，除鶴鶉(*Coturnix japonica*)為稀有的過境鳥外，其餘6種皆為留鳥。

台灣的7種雉科鳥類中，有4種為台灣特有種：台灣山鷓鴣(*Arborophila crudigularis*)、2015年改列特有種的台灣竹雞(*Bambusicola sonorivox*)、黑長尾雉(*Syrnaticus mikado*)以及藍腹鷓(*Lophura swinhoii*)；

台灣特有亞種則有環頸雉(*Phasianus colchicus*)。 黑長尾雉母鳥 · 王健得 攝



台灣的雉科鳥類為陸棲性，有生活於原始森林或次生林底層，如：黑長尾雉、藍腹鷓、台灣山鷓鴣及台灣竹雞；也有分布或出現於平地至丘陵地帶的草生地之中，如鶴鶉、小鶴鶉(*Synoicus chinensis*)及環頸雉。雉科各鳥種間體型差異很大，最大型的如帝雉(♂ 90cm)、環頸雉(♂ 80cm)，而最小的如鶴鶉(17-19cm)、小鶴鶉(12-15cm)。牠們的共同特徵就是身體粗壯、嘴粗短、腿腳強健，十分適合行走於地面。根據台灣鳥類誌(劉小如等，2012)，雉科鳥類性甚害羞而機警，當與人不期而遇時，如雙方距離尚遠，會快步跑入草叢裡；如距離甚近，會急迫躍飛逃離，同時發出連續短音的鳴叫聲。有些種類夜間時會棲息於樹上過夜。為雜食性，以喙啄食地表植物的新葉、幼芽、花、漿果、種子，也常在走動時，用喙或爪撥開地面落葉或腐植土，再用喙啄食土中的蚯蚓、螞

蟻、毛蟲、蛙類以及其他昆蟲。有時也會伸長脖子或跳躍取得較高的食物。

雉科長久以來被視為供打獵的鳥，有些種類被豢養成家禽，雞肉與雞蛋成為我們動物性蛋白質的重要來源。除了提供食用，雞也與人類生活有很許多聯結，如熟知的雞毛撢子是取其羽毛製成，而自古以來與雞有關的俗諺或成語也很多，如聞雞起舞、殺雞取卵...等，而在某些國家還有鬥雞的民俗活動。而雞也是習俗上十二生肖之中排行第十的動物。

許多雉科鳥類的公鳥，都具有羽色鮮麗、臉部有肉質的冠與肉垂，且有很長的尾羽等特徵，尤其是孔雀屬(*Genus Pavo*)、長尾雉屬(*Genus Syrnaticus*)、錦雞屬(*Chrysolophus*)、鷓屬(*Lophura*)和雉屬(*Phasianus*)，是令人喜愛收集、豢養或展示的珍禽，因而對牠們造成很大的獵捕壓力，使得許多雉科鳥類都躍上了國際保育名單。在台灣，雉科鳥種除了有獵捕壓力而名列保育類名單中，有些野外族群量原本便十分稀少、不易見到，或受到環境開發而壓縮其分布的空間。目前保育類雉科鳥種有小鶴鶉、台灣山鷓鴣、黑長尾雉、藍腹鷓及環頸雉等5種，台灣山鷓鴣為III級(其他應予保育)保育類野生動物，其餘4種皆為II級(珍貴稀有)保育類野生動物。



環頸雉 · 李俊輝 攝

體型大：♂ 70cm以上；♀ 45-60cm

### 黑長尾雉 *Syrmaticus mikado* (Qgilvie-Grant, 1906) · Mikado Pheasant

- \* 雄鳥體長可達90cm，雌鳥約50cm，體型粗壯，嘴、腳鉛灰色。
- \* 雄鳥全身大致黑色，有光澤、羽緣藍色。尾羽甚長有白色斑紋分節腳鉛黑色，眼周圍裸露部分紅色。
- \* 雌鳥較小，全身褐色為主，背面有蠹斑，腹面有白色「V」形斑。

母鳥·王健得 攝

- \* 又名帝雉，稀有留鳥，是台灣特有種，分布於中、高海拔樹林底層或林緣地帶，有棲地減少及過度獵捕的壓力，列為II級珍貴稀有保育鳥類。



公鳥·王健得 攝

### 藍腹鷓 *Lophura swinhoii* (Gould, 1863) · Swinhoe's Pheasant

- \* 雄鳥體長可達77cm，雌鳥約55cm，體型粗壯，嘴鉛灰色，腳紅色。
- \* 雄鳥全身藍色有光澤。尾羽甚長，中央尾羽最長、白色。腳、眼部裸露部紅色，頭上冠羽及上背白色

- \* 雌鳥全身褐色為主，背有蠹斑，腹面有暗色「V」形細紋，外側尾羽栗褐色。

- \* 台灣特有種，不普遍留鳥，分布於中、低海拔森林底層，有棲地減少及過度獵捕的壓力，列為II級珍貴稀有保育鳥類。



公鳥·簡廷謀 攝

母鳥·柯木村 攝

### 環頸雉 *Phasianus colchicus* (Linnaeus, 1758) · Ring-necked Pheasant

- \* 雄鳥體長可達80cm，雌鳥60cm，體型粗壯。嘴橙黃色，腳灰褐色。
- \* 雄鳥頭綠色有角羽，體紅褐色。眼裸露部紅色，頸側至頸後有白色頸環，背褐色有黑縱斑，翼灰褐色，尾羽甚長，褐色有黑色分節，腹面紅褐色有鱗狀斑。
- \* 雌鳥褐色，背有蠹斑，腹側有暗色「V」形細紋，尾有淡色橫紋，胸至腹中央淡褐色。

張健樂 攝

- \* 台灣特有亞種，稀有留鳥，棲息於草原、農耕地及甘蔗田等地，因引進外來亞種雉雞與原生族群有雜交現象，且西部平原開發造成棲息地消失並有獵捕壓力，列為II級珍貴稀有保育鳥類。



公鳥·蘇貴福 攝

母鳥·王健得 攝

## 體型中：20cm以上

**台灣竹雞** *Bambusicola sonorivox* (Temminck, 1815) · Taiwan Bamboo-Partridge

- \* 體長30-32cm，雌雄同色。
- \* 頭至頸、上胸藍灰色，背褐色，腹橙色有栗褐色斑紋。腳鉛灰色。頭上及喉部有栗褐色。
- \* 普遍留鳥，台灣特有種，分布於中、低海拔樹林、竹林底層及灌叢或草叢地帶



王健得 攝



李俊輝 攝

**台灣山鶇** *Arborophila crudigularis* (Swinhoe, 1864) · Taiwan Partridge

- \* 體長22-25cm，雌雄同色。腳紅色，頭頂橄欖色，眼周圍裸露部分黑色，頰至喉部白色有黑色頸圈。背綠褐色有黑色橫斑，翼有栗褐色斑，腹面藍灰色有細白軸斑。
- \* 又名深山竹雞，不普遍留鳥，台灣特有種，分布於中、低海拔之樹林底層，較常出現於懸崖之裸露地，性隱蔽不易見。列為III級其他應予保育之鳥種。



王健得 攝



柯木村 攝

## 體型小：20cm以下

**鶇鶇** *Coturnix japonica* (Temminck & Schlegel, 1849) · Japanese Quail

- \* 體長17-19cm。背褐色有白色縱斑，腹部白色。腳肉褐色，眉線白色，雄鳥臉紅褐色。
- \* 雌鳥黃白色眉線明粗，頰有暗灰色條紋。
- \* 又名日本鶇鶇，稀有過境鳥，出現於平地至低海拔之草原地或樹林底層。



沈炳雄 攝

**小鶇鶇** *Coturnix chinensis* (Linnaeus, 1766) · Blue-breasted Quail

- \* 體長12-15cm，頭小身體圓胖，尾短，嘴鉛灰色，腳橙黃色。頭至背面暗黃色，雄鳥背面密布黃白色羽軸，臉至腹側藍色，頰有白色斑塊，邊緣及喉黑色，腹部中央至尾下紅色。雌鳥背面似雄鳥，腹面為暗褐色有暗色橫紋。
- \* 又名藍胸鶇，稀有留鳥，通常出現於平地林緣、草原等地帶。列為II級珍貴稀有之保育鳥類。



公鳥 · 王健得 攝



母鳥 · 王健得 攝