

鷸科鳥類辨識

小撇步

整理／許勝發

鷸科跟鴉科是台灣濱海濕地冬季及春、秋過境期間最主要的鳥種，牠們棲息於各種灘地、淺水魚塭地及潮間帶間。鷸科跟鴉科的體色多偏灰色或褐色，兩者就外觀而言，鷸科一般嘴較細長（富有彈性）、眼較小、腿較長、體態較纖細；鴉科一般嘴較粗短、眼較大、腿較短、體態較圓胖，這種型態上的差異反應於微棲地利用及覓食行為上，鷸科一般以水表下的底棲生物為食，靠嘴喙震動來感知底棲生物的位置，故嘴喙多細長；鴉科則以露出灘地表層的底棲生物為食，靠目視搜尋食物，故嘴喙多粗短。以下是台灣南部地區過境及度冬期間較容易見到的鷸科、鴉科鳥種辨識方式：

一、鷸科

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|------------|---------------------|-----------------|
| 黑腹濱鷸 濱鷸 | 嘴端略為膨大，腰黑色 | 度冬群龐大，3月以後幾乎全離境 |
| 彎嘴濱鷸 滸鷸 | 嘴較細長，腰白色 | 過境期較多 |
| 寬嘴鷸 | 體型小於前兩者，嘴較寬扁，頭頂兩道白線 | 過境期可見，常混於其他鳥群中 |



黑腹濱鷸／濱鷸（王健得 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|--------------|------------------------|---------------------|
| 長趾濱鷸 雲雀鷸 | 體型稍高挑，嘴略長有小尖尾鷸的感覺 | 偏好淡水濕地、濱海地區，過境期較易見到 |
| 紅胸濱鷸 稗鷸 | 體型較矮小 | 群聚，度冬或過境 |
| 丹氏濱鷸 丹氏稗鷸 | 頭及背部顏色最均勻，似稗鷸，但腳黃色，嘴略長 | 小群或單獨過境，數量稀少 |



紅胸濱鷸／稗鷸（楊玉祥 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|------|-------------|-----------|
| 青足鷸 | 嘴較粗，略上翹，體型大 | 常在水深及胸處覓食 |
| 小青足鷸 | 嘴細尖，體型纖細 | 過境期較多 |



青足鷸（李俊輝 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵／生態習性 |
|-----|---|
| 赤足鷸 | 嘴尖黑色，基部橘紅色，腳較短，次級飛羽白色 |
| 鶴鷸 | 嘴尖細，黑色，下嘴基部紅色，腳長，常在深水區活動；冬羽白色眉線較清楚，次級飛羽灰褐色。於過境期出現 |

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|------------|---------------|------------|
| 大濱鷸 姥鷸 | 體型較大，嘴粗腰，白色 | 過境期出現 |
| 紅腹濱鷸 漂鷸 | 體型較小，嘴略粗，腰灰褐色 | 過境期出現，少數度冬 |



大濱鷸／姥鷸（陳世明 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|-----|-----------------------|----------------------|
| 黑尾鷸 | 嘴直，腳略長，尾部黑色；夏羽腹部有黑色橫斑 | 過境期較多，常與斑尾鷸、中杓鷸等混群遷移 |
| 斑尾鷸 | 嘴略上彎，腳較短，尾部有斑紋 | 過境期較多，常與黑尾鷸、中杓鷸等混群遷移 |



黑尾鷸（楊玉祥 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|-------|-----------|--------|
| 半蹼鷸 | 腳黑色 | |
| 長嘴半蹼鷸 | 嘴基帶黃色，腳黃色 | 傾向淡水環境 |



半蹼鷸（楊玉祥 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵 |
|-----|--|
| 田鷸 | 翼下較白（另一亞種翼下較暗，約 30%），次級飛羽末端白色，尾羽 14 枚（偶而有 12 或 16 枚） |
| 針尾鷸 | 翼下較暗，次級飛羽末端白緣不明顯，尾羽 26 或 28 枚，外側寬度小於 2mm |
| 中地鷸 | 翼下較暗，次級飛羽末端無白緣，尾羽 20 枚或 22 枚 |
| 大地鷸 | 翼下較暗，次級飛羽末端無白緣，尾羽 16 枚或 18 枚 |



針尾鷸（陳世明 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 靛鷸 | 嘴約頭部三倍長，腹部褐色，翼下褐色 | 過境期可見，數量不多 |
| 大杓鷸 | 嘴約頭部三倍長，腹部色淡，翼下白色，腰白色 | |
| 中杓鷸 | 嘴約頭部二倍長，黑褐色，頭側線，腰白色 | 棲地類型較多樣，灘地、岩岸、草地皆可棲息 |
| 小杓鷸 | 嘴短，僅微下彎 | 過境期出現，數量稀少，偏好旱作地或短草環境 |



中杓鷸（陳世明 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|------|--------------------------|-----------------------------------|
| 磯鶺 | 翼角有「V」白色區塊，腳青灰色，有白翼帶、白眉線 | 常單獨沿水線邊緣活動 |
| 白腰草鶺 | 腰白色，腳灰黑色，翼全黑，白眉線僅到眼睛周圍 | 偏好河流環境，單獨或成對活動 |
| 鷹斑鶺 | 腰白色，背部密佈白色斑點，腳黃色，有白色眉線 | 偏好淡水濕地（內陸性涉禽），常成大群棲息，過境期才會出現在濱海地區 |



鷹斑鶺（王健得 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|-------|------|--------------------|
| 紅領瓣足鶺 | 嘴較細長 | 過境期較常見到，族群量不規律 |
| 灰瓣足鶺 | 嘴較粗厚 | 數量稀少，較常出現於冬季較嚴寒的時候 |



紅領瓣足鶺（李俊輝 攝）

二、鶺科

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|-------|--------------------|-------------------------|
| 東方環頸鶺 | 頸部有白環，腳灰色 | 夏候鳥繁殖個體頭為灰褐色，不帶紅色 |
| 小環頸鶺 | 體型最小，嘴短，眼睛周圍黃色，腳黃色 | 過境期較常見，夏候鳥族群會在河川的礫石地上繁殖 |



東方環頸鶺（王健得 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|-----|-----------|---------|
| 蒙古鶺 | 體型較矮小，嘴較短 | 度冬或過境皆有 |
| 鐵嘴鶺 | 體型稍高大，嘴較長 | 過境期數量較多 |



蒙古鶺（楊玉祥 攝）

| 鳥種 | 外觀特徵 | 生態習性 |
|-----|--------------------------|------------------|
| 灰斑鶺 | 體色為灰色調，幾乎無黃色成分，翼下白色，脇羽黑色 | 偏好河口大型灘地，單獨或小群出現 |
| 金斑鶺 | 體色帶金黃色，翼下灰色 | 棲地多樣，度冬族群數量較多 |



灰斑鶺（陳俊強 攝）