

凌雲巖 縱走大湖尖山 | 植物介紹

凌雲巖坐落於嘉義縣竹崎鄉文峰村的大坑山頂，主祀觀世音菩薩，創建於民國53年佛祖顯靈託囑，利用水災崩壁之石雕刻聖尊，二、三年後，佛祖連連託夢，村內耆老再嘔心雕塑二媽及三媽，選址在大坑山青石古道終點，所有建材全是村民徒手搬運，每日往返2763階梯，土法煉鋼，胼手胝足完成。

文、圖／黎明裕

中研院林美容博士指出，巖即山寺，清代〈彰化縣志〉記載：「閩省漳泉南人，謂寺曰巖。」同志〈祀典志〉云：「閩人將山寺曰巖」，顯然巖是指靠山的佛寺或寺院而言，試比較佛寺，主要修身、打坐、無主神觀念、具納骨塔、有僧侶無乩童、無繞境出巡、吃素、建築無翹脊；反之，巖都具備，另宮廟最小，主要以香火廟、以公眾祭祀，求集體福祉。台灣巖仔信仰以觀音為主體，藉由觀音佛祖普渡眾生的精神，與地方公廟構成護生濟亡的信仰體系。觀音菩薩慈航普渡，跨越佛教殿堂，讓民間佛教更深入撫慰普羅大眾之心靈。觀察高雄市三大巖，即林園清水巖、大社翠屏巖(大覺寺)、阿蓮大崙山巖(超峰寺)，觀音祂對有情眾生的看顧，保護山下庄眾的神廟，構成陰陽具備的神靈保護網。

南華大學陳玉娟論文指出台灣四大名山，大崙山超峰寺是由巖仔轉變成佛寺。早期三十六庄，包括阿蓮鄉全部、岡山區潭底、前峰、五甲尾為祭祀圈，後來在永定法師經營下，邁向正統佛教。但依舊有佛教民間化，如進香活動，不同於高雄市打鼓岩元亨寺全面禁止。每年觀音誕生日，觀音殿鑼鼓喧天，香客洶湧，三寶殿屬後殿則誦經念佛，莊嚴肅靜。超峰寺是一座佛教與民間信仰兼容的佛教道場。

要前往凌雲巖，可從國道三號下竹崎交流道後，行駛166線往竹崎，再接嘉122往瑞里方向，53.6公里文峰遊客中心看到盛開令人驚豔



上圖：凌雲巖；下圖：超峰寺

的櫻花雨～花旗木(*Cassia bakeriana*)，就屬嘉199道路，沿途有凌雲巖指示牌，行約6.2公里到達大坑古道王厝登山口，附設涼亭與廁所。

福安宮門聯「福掌五銖通利用，安衡九府溥財源。」停車場種植山櫻花、含笑花、茶花、黃金小神童、金釵蘭、鶴頂蘭、美人蕉、火焰木、蘋婆、紅龍果、土肉桂以及甜龍筍。甜龍筍又名版納甜龍竹 (*Dendrocalamus hamiltonii*)，林試所曾在1967年由泰國引進，後



花旗木



矮球子草



紅色茶花

改由中國大陸雲南省。筍質細緻，沒有粗纖維及苦味，甜度高可供生食。路邊水塔長滿虎耳草、萬年松、金蓮花、石菖蒲及一株百年梅樹，樹上附生腎蕨、崖薑蕨、台灣山蘇、海州骨碎補及柃樹藤。停車場山壁有外型如薄葉蜘蛛抱蛋的矮球子草(*Peliosanthes macrostegia*)，平行脈葉片若要製作山豬耳肉粽，可能要摘好幾片葉片。根莖搗爛治蜂蠍刺螯、毒蛇咬傷，其花絲短，合生成肉質內彎的環，蒴果具1-3顆小核果，種皮肉質，鮮藍綠色。其它有細葉麥門冬、白背芒、曲莖馬藍、大頭艾納香、牛奶榕、冷清草、菊花木、台灣鱗球花。

穿越前竹崎鄉鄉長王焜弘古厝，踏上2600青石階，朝聖凌雲巖邁進，以虔誠膜拜觀音佛祖，洗滌信徒心中雜念。古老柳杉電線桿編號K5100 CB625分3，丈量胸寬97公分，經過山中風雨摧殘試煉，至今完好如初。觀察檳榔林周圍有阿里山通泉草(*Mazus goodenifolius*)，其葉脈中肋較紫色，唇瓣上的斑點屬於小斑點，不同於高山通泉草。其它尚有白英、中國穿鞘花、颱風草、姑婆芋、紫花藿香薊、大青、全緣卷柏、白臼、茯苓菜、馬藍、風輪菜、旋莢木、杜英及馬拉巴栗小苗。

雲竹亭海拔809公尺(211858, 2599979)，亭側種滿茶花品種，大致有黃連華、非常香、超級克拉馬；超級克拉馬分類屬於日本種紅山茶，紅至淡紅，花徑大輪至巨大，呈現牡丹花型，1957年登陸。文震亨的山茶絕句：「似有

濃妝出絳紗，行光一道映朝霞；飄香送艷春多少，猶如真紅耐久花。」左邊大坑15號民宅舊路直上凌雲巖。觀察栽種20年紅檜胸寬71公分、台灣肖楠83公分，種植有斑葉君子蘭、真柏、蜘蛛百合、鹿角蕨、皋月杜鵑、黃金小神童、山櫻花、紫藤、虎頭蘭，野生有虎婆刺、火炭母草、山香圓、杜虹花、山芙蓉、白臼、台灣天仙果、狗骨仔、賊仔樹、裡白楳木、台灣山桂花、香澤蘭、華八仙、烏心石、山棕，偶見瓜葉馬兜鈴(*Aristolochia cucurbitifolia*)，喇叭形花管呈U形彎曲狀。

第二亭「回音亭」海拔1009公尺(212269, 2599747)，有2株李樹與一幢工寮，栽植枇杷及龍眼。孟宗竹次生林發現有大武牛尾菜(*Smilax riparia*)，廣西稱為軟葉菝葜、白鬚公，橢圓形葉片，有明顯掌狀脈和皺褶的細脈，葉柄上捲鬚2條長達15公分，其根狀莖有止咳祛痰，嫩苗可蔬食。常見山黃麻、香蕉、石朴、黃藤、大葉楠、小花蔓澤蘭、白匏子、月桃、水同木、小葉桑、紫花藿香薊、百步、山葛、天門冬、早田氏鼠尾草、田代氏澤蘭、酢漿草、台灣圓腺蕨。

第三亭「夜美亭」海拔1073公尺(212374, 2599704)，榕樹下有攀附金錢豹，分類學者以北緯25度，若花冠較大者約1.8公分以上，稱大花金錢豹；若花冠僅1-1.3公分，稱為金錢豹。花冠鐘形，淡黃色，花瓣中央紫色，內緣有紅暈，雄蕊5枚，柱頭4-5裂。伴生有黑星紫金



遠眺四大天王山

牛、紫背鴨跖草、台灣何首烏、台灣崖爬藤、假福王草和大葉溲疏(*Deutzia pulchra*)。溲疏為藥學名，溲意為尿、疏則為疏導順暢，藥用利尿、退熱，但具毒性需慎用。廣泛分布，中國大陸有53種，初夏白花滿樹，潔淨素雅，重瓣變種叢植更加華麗、壯觀。

凌雲巖海拔1141公尺(212496,2599621)，左眺竹崎鄉鎮、嘉南平原，右視四天王山、篤鼻山、表園山、知鳥山，四座1400公尺中級山環列拱向，連綿而成，群峰環繞、雲海波濤。春天廣場碧桃、山櫻花，花蕊像一朵朵太陽花，迎風招展，婀娜多姿，陪襯有中輪、大輪的虎頭蘭，園藝植物有台灣五葉松、朱槿、金英花、桂花、玉蘭花、側柏、杜鵑、月橘、黑松、細葉雪茄花、金蓮花、地湧金蓮、夜香花、垂柳、四川雲柏、蘆薈、射干、青葙、雞

觴刺，偶見稀少的台灣油杉(*Keteleeria formosana*)，是1899年由日人田代安定在新店Bunsauho文山堡發現。鄰近廁所山崖的野生植物有山桐子，其雄花序盛開枝頭，猶如一團煙火球。另有野桐、密花苧麻、山黃麻、海州常山、鎊毛鐵線蓮、五節芒、台灣懸鉤子、山葛、小葉桑、冇骨消、佩羅特木、榎葉懸鉤子、裡白樺木、山芙蓉。

觀音石海拔1238公尺(212526,2599421)，大坑山最高點，佛祖顯靈，其恩澤莫不銘感五內，故凌雲巖提供遊客爐具、瓦斯、茶具、碗器免費使用，彰顯觀音媽普渡芸芸眾生。祭台兩株胸寬160公分的台灣赤楠，中台禪寺撰文「繖狀花序，纍纍漿果，綠泥婆娑，紅芽鑲翠，如朝霞薰染於樹梢，似晨光綻放於翠蔭。大人者磊實步履亦如是，在微細心念中觀照，



君子蘭



大武牛尾菜



山桐子

觀音石

在歲月更迭中成熟；待繁花盛放後，即是菩提果滿的芬芳。」平台前方西南遠眺布袋麥寮港，西北注視玉山北峰傲人雄偉。環視觀音石，全身披滿台灣蘆竹，右側有一株鵝掌藤 (*Schefflera arboricola*)，眾多氣生根懸垂如觀音佛祖的千手護持。據說攀援根長達8公尺。其它著生植物有牛奶榕、台灣懸鉤子、白背芒、石葦、全緣卷柏、三角西番蓮、山葛、腎蕨、走馬胎、台灣澤蘭、黑果馬廸兒、大葉溲疏、天門冬、骨碎補、落新婦、根節蘭、巒大秋海棠、咬人貓、假糙蘇等。

折回石階文峰山叉路海拔1171公尺(212478,259947)，整片石竹次生林被奮取湖工作站回收管理。林下有南華南蛇藤 (*Celastrus hindsii*)，是太武山花崗岩優勢植物，針對植株乙醇粗萃取物，發現其化合物具有抗腫瘤細胞毒性：紅色肉質假種皮7月蒴裂，種子油含45%，適合生物燃料油，清潔無污染，燃燒性優越。其它有山紅柿、長葉木薑子、琉球雞屎樹、香葉樹、疏花魚藤、中國穿鞘花及黃精屬的萎蕤。萎蕤，明朝李時珍在「本草綱目」指出是草名，即玉竹；又指草木茂盛狀，唐朝張說〈離會曲〉「可憐河樹葉萎蕤，關關河鳥聲相思」；或指樹姿柔軟狀，唐朝王琚〈美女篇〉「屈曲屏風繞象床，萎蕤翠帳綴香囊」。

產業道水泥路，變電箱號29973972有紅楠胸寬117公分及台灣肖楠73公分。殼斗科群叢有三斗石櫟113公分、短尾葉石櫟85公分，伴隨蘋婆、黃藤、樟葉楓、山香圓、金毛杜鵑、火炭母草、華八仙、白背芒、茄苳、金雞納樹、台



鵝掌藤的氣生根懸垂
台灣鱗毛蕨、紫花藿香薊。桃元宮門聯「文賢聖照桃元脈，峰巒翠竹慈中軒」，宮前荷花池古歌訣曰：「片錢半月塘，財谷百千倉。」較粗壯巨木有假長葉楠胸寬123公分、紅楠81公分，園藝栽培種有濕地松、桂花、梅、樹葡萄、香蕉、桃、四季桔、水柳、野薑花、虎頭蘭、黃鐘花、蓮霧、一種肉桂、皋月杜鵑等。

文峰山海拔1256公尺(212635,2599176)，屬孟宗竹林植物社會

文峰山無三角點，2003年是台灣小百岳之一，2006年被除名，未登文峰山前往大湖3號出口。三角點位置是竹崎鄉與番路鄉交會，牛稠



鵝掌藤



南華南蛇藤



萎蕤



桃元宮

溪與八掌溪的分水嶺。植物有孟宗竹胸寬30公分、白雞油、山奈、柚、細葉饅頭果、奧氏虎皮楠、鵝掌柴、白匏子、火炭母草、菲律賓楠、圓葉雞屎樹、玉山紫金牛、糙莖菝葜、小花鼠刺、屏東木薑子。相思樹巨木海拔1230公尺(212808, 2599142)，胸寬325公分，總共3株分列在稜線步道兩旁，附著柃樹藤、絡石、風藤與台灣山蘇，伴隨常見小梗木薑子、杜英、玉山紫金牛、狗骨仔、大頭茶、冷清草、小唇蘭，偶見阿里山灰木。穿越瘦小石竹次生林至大湖2號出口海拔1258公尺(213351, 2598997)，又進入孟宗竹林。地被植物有紫背鴨跖草、川上氏月桃、火炭母草、冷清草、長梗紫麻、邊孢鐵角蕨，偶見一葉鱗花蘭(*Acanthephippium striatum*)，種小名strip(線條)，形容花朵上暗紅色條紋。中名一葉鍾馗蘭，名字源自葉似長劍，有如鍾馗佩戴寶劍

擋煞避邪。空曠向陽

高地海拔1363公尺

(213516, 2598766)，

右眺觀音石平台及文

峰山，整齊一致的孟宗竹

林，高地植物有青剛櫟、細葉饅頭果、玉山紫金牛、小梗木薑子、黃杞、菲律賓楠、台灣絡石、台灣蘆竹、裡白葉薯榔、阿里山千金榆和疑似人為種植的楊梅。



一葉鱗花蘭

天雲山海拔爲1371(1355)公尺(213477, 2598728)，屬相思樹植物社會

天雲山又稱青雲山、火焰山，無三角基點，視野遼闊。近眺南面大湖尖山、西面文峰山崩壁，遠望東南方二延平山、隙頂山至玉山山脈和後方南大武及關山稜線。中心點粗壯相思樹胸寬154公分、短尾葉石櫟133公分，其它有小梗木薑子、屏東木薑子、紅楠、玉山紫金牛、粗毛柃木、台灣肉桂、小花鼠刺、奧氏虎皮楠、細葉饅頭果、台灣八角、西施花、颱風草、中國穿鞘花、紫背鴨跖草，偶見台灣楊桐，和一大堆不知從何而來的蒼蠅。指標至大湖尖山需80分鐘。穿越巨石、懸崖陡岩，回眸眺天雲山聳直斷崖的山容。附近有人爲的油茶胸寬68公分及棕櫚40公分；棕櫚(*Trachycarpus fortunei*)，黑色葉鞘纖維可製作掃帚、毛刷、蓑衣、床墊、濾網、扇帽、工藝品，蓑衣冬暖夏涼、輕軟透氣；裝飾品有豐收、避邪之寓意。杜英巨木海拔1264公尺(213073, 2598444)，胸寬194公分，伴隨台灣天仙果、呂宋莢蒾、台灣肉桂、長葉木薑子、忍冬葉冬青。下切鞍部麻竹及石洞避雨處，再陡上拉繩至瘦稜。青剛櫟板根巨木海拔1314公尺(212993, 2598317)，底座分叉成6枝，胸寬329公分，枝幹附生絨毛石葦、星蕨及絡石，附近植物有大頭茶90公分、紅葉樹82公分及東瀛珊瑚。

東瀛珊瑚(雄花)



天雲山峭壁

胸寬329公分的青剛櫟



東瀛珊瑚(*Aucuba japonica*)，仔細觀賞4枚紫色花瓣，紫色花瓣，雄花序花藥4枚呈白色，雌花序花柱1枚呈綠色，熟果雄花序花藥4枚呈白色，雌花序花柱1枚呈綠色，熟果卵圓形，紫色鮮豔。比較相似種桃葉珊瑚，葉狹長披針形，小枝有毛，熟果卵圓形。在中國大陸浙江一帶，木材可製作手杖、煙管。其它植物尚有烏皮茶、大錦蘭、九節木、山龍眼、石月、疏花魚藤、藤花椒、裡白菝葜、珍珠蓮、琉球雞屎樹、奧氏虎皮楠以及烏心石等。

大湖尖山海拔為1317(1313)公尺(212962, 2598284)，屬相思樹植物社會

3顆巨石中央豎立嘉義山岳協會鐵絲網三角碑，長120x90公分，無三角點。又名尖嶺仔山、尖山，位於嘉義縣番路鄉大湖村與竹崎鄉光華、仁壽村交界，為台灣小百岳之一，地處牛稠溪與八掌溪的分水嶺，巍峨山稜西南方接半天岩、三寶山。廣場四柱鋼亭被大樹抵擋無視野，紅楠4分叉胸寬295公分、相思樹100公分、裡白櫟木65公分、石朴、柚子、奧氏虎皮

楠、大葉溲疏、白背芒、紅果苔、米碎柃木、山桂花、百香果、牛奶榕、刺茄、栗蕨、瓢簍藤、野牡丹、山黃麻、白匏子，

偶見無脈木犀(*Osmanthus enervis*)，1912年田中市二於屏東牡丹社發現，由正宗嚴敬與森邦彥(Mori, K)共同發表。

尖山步道400公尺第三座 無脈木犀涼亭海拔1163公尺(212777,2598376)，右側有長葉木薑子、台灣山桂花、細葉饅頭果，是水泥產業道路，往下可直通登山口。觀察石階步道，縫隙植物有乞食碗、黃堇、爵床、黃鵲菜、小毛蕨、絞股藍、車前草、茯苓菜、腎蕨等。下行左邊杜英巨木海拔1138公尺(212721, 2598341)，胸寬206公分。

第二座涼亭海拔1032公尺(212566,2598288)視野遼闊，遠眺烏心石山、三寶山、鳩州嶺、尖凍山連稜，南面是土匪山。亭前台灣肖楠人造林，最寬樹圍有97公分，常見有櫟、杉木、石竹林、小花鼠刺。陡下階至尖山800公尺指標牌海拔980公尺(212417,2598298)，不鏽鋼欄杆觀察有白臼、青剛櫟、白背芒、孟宗竹林、山黃麻、紅楠、鵝掌柴、白匏子、小葉桑、土密樹、華八仙、黃金葛、田代氏鐵線蓮(*Clematis tashiroi* var. *tashiroi*)，其主要辨識特徵為葉柄基部膨大形成盾狀托葉，葉心形3出複葉5出脈。



大湖尖山山容



黑木耳溫室

終點第一座涼亭海拔923公尺(212304, 2598333)，對面是黑木耳(*Auricularia auricula-judae*)農場，呂氏春秋曰：「味之美者，越駱之菌」，黑木耳富含豐富膠質，具有補氣益智、潤肺補腦；多醣成分抗腫瘤降低血栓作用，但高血壓、高血脂、高血糖者及手術拔牙有抗凝血作用，不宜多食。將相思樹木屑於戶外靜置一年，加入米糠、黃豆粉、玉米粉當作營養，製成太空包，經過高溫蒸氣殺菌，冷卻後植入菌種，黑木耳盛產期4-8月。登山口標誌大湖183分12電桿，屬檳榔林，除了大花曼陀羅、象草、竹子、香蕉之外，全是佛手瓜(*Sechium edule*)，多年生草質藤蔓，原產中南美洲、墨西哥、西印度群島，1915年才傳入中國，綠色嫩莖纖維蔬菜，又稱龍鬚菜。佛手瓜屬低鈉食物，蛋白質和鈣是黃瓜的2-3倍，對心臟病、高血壓病患是保健蔬菜。

折回水泥路至指標大湖183分32電桿可縱走返回天雲山、大坑凌雲巖。搭接駁車者，則直走1.5公里至縣道159甲25.8公里大湖村茶科聚落，路口有「大湖尖山2KM」指標，轉角有台電機房。大湖村內最盛名是鬼谷綠豆簾，依照網路製程有：第一階段竹腔發酵，將綠豆拌黃蓮、甘草等中藥植入第6節竹中，封蠟發酵120天。第二階段浸泡發酵，截斷竹節置入童尿

池內浸泡發酵。第三階段清泉發酵，第四階段劈開竹節，以30多種中藥浸味凍露晾曬。綠豆簾具解毒、降火、養肝及治青春痘、皮膚炎、喉嚨痛之藥效，市售珍珠五寶散含有此成分。

側柏

Platycladus orientalis (L.) Franco

柏科，屬名 Platycladus由希臘文 playts(扁)與 clados(側枝)締造而成；種名 orientalis指產自東方的。又稱黃柏(華北)、香柏(河北)、扁柏(浙江、安徽)、扁檜(江蘇)、香樹(湖北)。喬木，生長緩慢，株高15-20公尺，樹皮薄，纖維狀縱裂。小枝扁平，針葉鱗片狀交互對生，長0.2-0.4公分，先端微鈍，雌雄同株，球花著生枝頂，雄球花具6對交互對生雄蕊，花藥2-4，雌球花4對交互對生珠鱗，僅中間兩對具胚珠1-2枚，花期4-5月。球果卵狀球形，長2公分，肉質，成熟前呈藍色，果鱗6枚，鱗背具有反曲的尖鉤，最頂生者不孕性，每一果鱗具無翅種子2枚。分布原產在中國大陸東北後廣泛移植各省、朝鮮半島、日本、印度、伊朗；台灣因移民廣泛栽植。側柏葉枝葉向西，且枝葉濃密具寒氣，古人認為陰性，適宜陵墓、寺廟、公園，樹齡高達千歲。木材淡褐色，富樹脂、耐腐性強，供建築、家具、農具。藥用健胃、利尿，但誤食易噁心嘔吐、肺水腫、呼吸循環衰竭。

台灣筋骨草

Ajuga taiwanensis Nakai ex Murata

唇形科，屬名 Ajuga由希臘文a(無)與 jugum(束縛)締造而成。另一種古羅馬醫生 Scribonius Largus將古羅馬博物學家 Pliny 所用藥劑 obigo 誤書。中國誌異學名 *A. pygmaea* 種名指莖矮小狀。又稱散血草、白尾蜈蚣、九味一枝蒿，日本稱八重山十二單，指小花如一件件粉紫色和服。草本，矮小，基部分枝，枝細長柔弱，



台灣筋骨草



側柏



側柏



台灣筋骨草

白英

株高10公分，被灰白色柔毛。基生葉匙形或倒披針形，長2-4公分、寬0.7-1.2公分；莖上葉倒卵形長1.5公分、寬0.6公分，先端鈍，基部楔形，下延至葉柄，邊緣疏波圓齒，兩面背疏毛。聚繖花序著生莖中部以上葉腋內，花萼鐘形外被長柔毛，萼齒5枚，花冠紫色內含斑點，二唇形，上唇短、直立，頂端微凹；下唇寬大，前緣3裂，中裂片最長，雄蕊4枚，二強，花藥2室，柱頭2歧。小堅果4粒，橢圓形，具網狀皺紋。分布中國大陸江蘇、日本；台灣分布於中低海拔林緣。中國大陸吳德峰等人研究粗黃酮萃取物治療大白鼠肝損，另高血壓、降血脂、減緩氣喘、抗痢疾具有顯著藥效，可應用於化妝保養品。

白英*Solanum lyratum* Thunb.

茄科，屬名Solanum其為該植物的傳統拉丁文名稱，種名lyratum指葉形如豎琴狀。藤本，莖與小枝密被長柔毛。葉互生，豎琴狀長3.5-5.5公分、寬2.5-4.8公分，基部常3-5深裂，裂片全緣，側裂片愈近基部愈小，端鈍；中裂片較大，或橢圓形全緣，基部心形，兩面被毛。聚繖花序頂生或腋生，萼環狀無毛，萼齒5枚，花冠藍紫色或白色，自基部向外反折，



白英



金錢豹



金錢豹

雄蕊5枚，花藥深紫色，花藥頂孔裂，花絲短扁，基部合生，子房兩室。漿果圓球形，熟時由紅轉黑色，花期7-9月、果期9-11月。分布中國大陸江蘇、山東、福建、江西、廣東、四川及朝鮮、日本；台灣分布低中海拔森林。花冠藍紫色，適宜花廊懸垂觀賞、蜜源植物。中藥具有清熱解毒、祛風利濕、化痰，中醫研究抗腫瘤，金黃色葡萄球菌對綠濃桿菌有抑制作用。但全株有毒，鮮果毒性最強，含有龍葵鹼Solanine，人畜誤食有血便、腹瀉、體溫升高、呼吸急促、心律不整、虛弱等症狀，嚴重者致死。

金錢豹*Codonopsis javanica* subsp. *japonica* (Makino) Hong

桔梗科，屬名Codonopsis由希臘文kodon(鐘)和字尾opsis(有其貌)締造而成，意指該植物的花冠形狀很像一個鐘的樣子。中文稱山奶草屬，種名爪哇名。金錢豹中文源自花筒內瓣紋顏色如同敏捷的豹紋。多年生纏繞狀藤本，莖細弱光滑無毛，全株含有乳汁，主根肥大、肉質灰白，故又稱土黨參、野黨參、白洋參、土人參、川人參。葉對生，卵圓狀心形，長2-6公分、寬1-5公分，先端尖，邊緣淺

鋸齒。花單生，著生葉腋，花萼5枚，基部合生，花冠鐘形，淡黃綠色具紫色條紋，花筒內紫色，頂端5瓣裂反捲，花期5-11月，雄蕊5枚，柱頭4-5裂，子房5室。漿果半球狀壺形，由綠轉粉紅色，種子多數，深褐色，具網紋。分布中國大陸中南部至西南部、錫金、不丹、緬甸、爪哇、日本；台灣分布於低中海拔叢林。花冠向下綻放，紫色斑紋配合紫紅色漿果，是蜜源、誘鳥花棚植物。熟果可食，根當蔬菜或當藥用，具清熱、鎮靜、健脾補氣、通乳作用，青草藥煎服，味道微甘，潤肺生津。相似種玉山山奶草(*C. kawakamii*)葉長1-3公分、寬0.5-2公分，花冠鐘形、長筒狀，黃綠色無紫色條紋，柱頭3裂。

地湧金蓮 *Musella lasiocarpa* (Fr.) C. Y. Wu ex H. W. Li.

芭蕉科，屬名Musella由該植物阿拉伯土名mouz締造而成，因其字用來紀念第一羅馬大帝Octavius Augustus的侍醫Antonius Musa(63-14 B.C.)，故用為該屬名。種名lasiocarpa指果實密被綿毛狀。別名地金蓮、地湧蓮、地母金蓮、千瓣蓮花。中文名稱源自「滇南本草」。叢生草本，根狀莖水平，株高60公分假莖，基部不膨大，真莖在開花前呈現短小狀。葉橢圓形，長0.5公尺、寬約20公分，先端銳尖，基部圓形，葉背被白粉，柄基具葉鞘。花序直立，密集如球穗狀，長20公分，苞片乾膜質，黃色，每一苞片內含花2列，下部苞片兩性花或雌花，上部苞片為雄花。雄蕊5枚，子房3室，胚珠多數。漿果三稜狀卵形，密被硬毛，種子扁球形，具有白色種臍。分布中國大陸雲南海拔2500公尺以下山坡地或庭園內。台灣於1996年引進栽種。花期長達250天，相傳佛陀誕生時，每走一步生出金光閃閃蓮花，故代表



地湧金蓮

佛教寺院五樹六花的代表花卉之一；另外，五花有荷花、文殊蘭、黃薑花、黃玉蘭、雞蛋花。假莖汁解酒醉，花入藥具收斂止血作用。

紅果薹

Carex baccans Nees

莎草科，屬名Carex其為該植物的傳統拉丁名稱，種名baccans指漿果實；中名薹字，集韻：「薹，草名，夫須也。」字亦坐薹，具「爾雅釋草」蔬菜之花莖重發，俗謂之薹，如韭菜薹、蒜薹。根莖木質，稈近叢生，株高60-150公分，三稜形莖。葉片較稈長，寬0.5-1.6公分，闊線形，葉端漸尖，3條脈。圓錐花序，長5-25公分，分枝成5-20個小穗，下部葉狀總苞具鞘，小穗圓筒形，兼具雌雄花，雄花在上，長2-6公分，雌鱗片倒卵形，長2.5公分，頂端尖，花柱短，呈3裂。苞果，果囊倒卵球形，腫脹，成熟時由黃轉成鮮紅色，邊緣有刺毛，瘦果截狀先端具短喙。分布於中國、印度、錫蘭、中南半島及馬來西亞；台灣分布於中低海拔森林邊緣。中國植物誌稱漿果薹草、紅稗子，其果實鮮豔可食，野外求生時可採其嫩葉充飢，乾燥花束當插花、裝飾用，為台灣黑蔭蝶、銀蛇目蝶的食草植物，巫師採其葉為族人祈福骨折痊癒。藥用可調經止血、治小兒癩疹。

虎頭蘭

Cymbidium hookerianum Rchb.f.

蘭科，屬名Cymbidium由希臘文kymbe(船)締造而成，意指其小穗的內穎為船形龍骨狀且先端有芒。屬名稱蕙蘭屬或中國蘭屬。中名因花頭碩大，比雞蛋還大，故有虎頭之名，又稱東亞蘭、大花蕙蘭、喜姆比蘭、蟬蘭。多年生草本，假鱗莖粗壯，屬合軸性蘭花，假鱗莖約有12-14節，其中1-4節的芽較大，隱芽因年齡與環境不同形成花芽或葉芽，根系圓柱狀，肉質肥大。葉片2列，長披針形，長35-0公分、寬1.4-2.3公分，先端急尖，關節位於距基

地湧金蓮



虎頭蘭(大花型)



鶴頂蘭



紅果薹



鶴頂蘭

部。花葶從假鱗莖下部穿鞘生長，總狀花序7-14朵花，花被片6枚，外輪3枚萼片，花瓣狀，內輪為花瓣，花徑大約9-12公分，下方花瓣特化成唇瓣，橢圓形，3裂，基部與蕊柱合生，側脈片直立，中裂片外彎，唇瓣上2條縱褶片，鮮黃色，蕊柱向前彎曲，含乳突，花粉團2個，花期1-4月。蒴果狹橢圓形，長9-11公分。分布中國大陸廣西、四川、貴州、雲南、西藏、尼泊爾、不丹、錫金、印度；台灣主要栽培地是南投、台中、苗栗、嘉義。栽培種近2萬個，利用大花附生種、小花垂生種、地生蘭種，經人工雜交育成，花朵大小可分大花種、中花種、小花種，花色有白、黃、綠、紫紅、紫褐色斑紋，其中綠色富有香味。虎為福諧音，春節迎春納福、吉祥表徵，盆花觀賞、切花成胸花、捧花。姿顏雍容華貴，外銷高級花材。

*Phaius tankervilleae*(Banks ex L'Her.) Blume

蘭科，屬名Phaius是由希臘文phaios(微暗的)締造而成，意指花暗色；種名tankervilleae



虎頭蘭(大花型)

乃紀念法國唐卡維爾(Tancarville)地方女伯爵，命名者是卡爾·路德維希·馮·布盧姆(Karl Ludwig von Blume, 1796-1862)。鶴頂中名出自明代王象晉群芳譜「鶴蘭，葉大如掌，花似荳蔻，無香。」地生蘭，株高100公分，叢生狀，假球莖卵形或球形，具節間。葉呈3-5枚，倒披針形長40-60公分、寬8-15公分，尾端漸尖，葉表具有褶扇狀脈，葉基漸縮形成抱莖套疊球莖的葉鞘。總狀花序，花序軸高達60公分，著生4-10朵紫紅花，花苞片早落，萼片和花瓣近等大，唇瓣基部貼生於蕊柱基部，花之外部白色，內部邊緣白色，中央內紫紅色，先端邊緣呈波浪形，唇盤具2條褶片，距細圓柱形，呈鉤狀彎曲2裂，蕊柱白色細長，蕊喙大近舌形，柱頭側生，花藥2室，花粉塊8枚。蒴果6稜。分布於日本琉球、印度、泰國、馬來西亞、爪哇、澳洲、中國大陸的廣東、雲南、福建、香港、海南；台灣生長在低海拔林緣、潮濕溝谷。盆栽或庭院蔭地栽植，盛花期2-4月，花朵壽命15-20天，花葶柔中帶艷，具有淡淡芳香。假球莖具清熱解毒、祛痰止咳之藥效。相似屬根節蘭屬與肖頭蘭屬，其唇瓣基部合生蕊柱基部。