



枋野具山、巴層巴墨山、北湖呂山 植物介紹

從枋野具山眺望中心崙山、里龍山、竹坑山等山巒美景

文、圖／凌明裕

獅子鄉排灣語Sisgu，位於屏東東南方，北臨春日鄉，東鄰台東縣達仁鄉，西鄰枋山鄉，西南連車城鄉，南接牡丹鄉，屬屏東縣最大鄉鎮。1875年獅頭社事件，清朝欽差大臣沈葆楨發動開山撫番政策，淮軍攻擊內獅頭社、外獅頭社、竹坑社、本武社、草山社，歷時兩個月與社人和議，結果清軍病死戰歿達1918人，包括將領王開俊，屏鵝公路南下南世村前嘉和隧道的路旁，有王太帥鎮安宮歷史見證。內獅部落(Kacedas)屬大龜文(Tjakuvukuvulj)社群，是南排灣建立酋邦，又稱琅嶠上十八社或大龜文十八社，是一個有組織與規模的酋邦，曾統治23個盟部及數個漢人村落。內獅部落原居住在中央山脈霧土、巴卡路卡路寺山一帶，後來遷居南勢湖，日據時代取名內獅頭，後刪掉改成內獅村。北邊小內獅居民來自旁武雁社人15戶、巴卡羅社24戶、內獅頭社2戶；大內獅的居民則來自武雁社4戶、巴卡

羅社7戶、內獅頭社47戶、霧里乙社17戶、外文社4戶、內文社3戶、外獅頭社19戶。因地緣關係且距平地近，自荷蘭、清朝、日本時期接觸外來族群，因此清朝設立學堂，日治時期設立內文社群最高學府並學會種植水稻。

枋野具山海拔483公尺，南、北湖呂山連稜向南延伸經巴層巴墨山後稜尾的一個小山頭。行車資訊由台1線452.25



獅子鄉標誌



南迴鐵路

公里，山隆加油站對面枋山觀光農園牌樓，沿解編屏147-1線枋山溪南迴鐵路維修道路東行，4公里過枋山溪橋後左轉卡悠峰瀑布，直行往巴層巴墨山、外麻里巴山。右轉1.9公里左岔至卡悠峰瀑布，右行取水泥路，續行約220公尺停車，右側廢棄產業道，電線桿編號南迴幹100.L44.T5929CD94。

枋野具山登山口海拔113公尺(218326, 2464635)屬銀合歡植物社會

登山口最佳地景是火車穿越南迴鐵路隧道，擁抱在愛文芒果森林內，黃連木胸圍最大僅50公分，樹冠有穿山龍與腺果藤，伴生向陽樹種～構樹、血桐、蟲屎、克蘭樹，其餘常見小葉桑、咸豐草、姬牽牛、疏花魚藤、山黃梔、山珠豆、馬櫻丹、雞屎藤、角花烏斂莓、三角葉西番蓮、毛西番蓮、假酸漿、恆春厚殼樹、金午時花、野棉花、朝天椒、密花白飯樹、大黍、揚波及多子漿果莧。多子漿果莧(*Deeringia polysperma*)又名白漿果莧、烏魚花、印度紐藤，花季盛開與烏魚洄游南下產卵季節相同，故稱。每年9月9日大約冬至前後10日，烏魚由紅毛港至枋寮海域集結洄游，海面形成水霧，烏魚結柱，魚群萬頭鑽動，本草綱目描述烏魚：「生東海。狀如青魚，長者尺餘。其子滿腹，有黃脂味美，獺喜食之。吳越人以爲佳品，腌爲鮓臘。」就是指現今烏魚子。多子漿果莧棲息蘭嶼，會因海風、鹽分，葉形呈現落葵波浪狀葉片。

穿越山溝，需注意右側有通電鐵絲網，轉彎映入眼簾由左至右的是～霧里乙南山、霧里乙山、946峰、霧里乙東北峰、南湖呂山、825峰、巴層巴墨山等群峰山巒。近瞰克蘭樹(*Kleinhovia hospita*)，屬名是紀念荷屬東印度公司的德國醫生克里斯蒂安·克林霍夫(Christiaan Kleynhoff)，1757年在巴達維亞(雅加達)建立藥用植物園，1762年辭職，回荷蘭庫倫堡擔任恩斯皮克勳爵。花兩性，5枚粉紅色花瓣，其中1枚匙形黃緣狀，特有雄蕊筒，頂端膨大含花柱與子房，蒴果梨狀，膜質膨脹內含疣狀種子。排灣族稱其爲Katazya'ppu，木材可製造繩索、刀鞘、農漁具，六龜區中興村尾庄路德福宮旁有株160歲樹齡老樹。

廢棄產業道海拔231公尺(218256, 2464207)觀察野桐屬的台灣白匏子(*Mallotus paniculatus* var. *formosanus*)與白匏子兩種同時存在，相同點爲葉闊卵形具有2腺點，葉背密被白色星狀絨毛；相異點是台灣白匏子葉緣呈不規則淺裂。雌雄異株，花無花瓣，雄花簇生，雌花穗狀，柱頭3歧。崩場地最佳復育樹種，木材做薪炭、小型器具與木屐。刺竹林分散在道路兩旁，發現山柑科的魚木與山柑兩者同時存在。魚木莖無刺，大喬木，雄蕊花絲呈紅色；山柑(*Capparis formosana*)木質藤本，多年生攀緣灌木，莖部具鉤刺，花白色，腋生，萼片和花瓣皆4枚，白色雄蕊多數，近觀如煙火齊發，



克蘭樹排灣族稱其爲Katazya'ppu



山柑果熟時，會由綠轉深紫色



俗稱山柑的盆栽，是指大戟科的白樹仔

果熟由綠轉深紫色。俗稱山柑盆栽是指大戟科白樹仔，主要欣賞蟠幹懸崖樹姿，提高生活雅致。

產業道路常見植物有稜果榕、小梗木薑子、密花白飯樹、烏皮九芎、粗糠柴、山黃梔、九芎、相思樹、樟葉楓。地被植物有串鼻龍、盤龍木、扛香藤、龍眼苗、山素英、毛蓮菜、長花九頭獅子草、台灣鱗球花、苞花蔓、木鼈子、姑婆芋、青苧麻及猿尾藤。猿尾藤 (*Hiptage benghalensis*) 又名風車藤、虎尾藤、牛牽藤、風箏藤，木質藤本，徑達12公分，如台灣獼猴長尾巴，排灣語稱Kaolit，走莖可編製魚筓的圓口，葉片是淡綠弄蝶、鸞褐弄蝶 (橙翅傘弄蝶) 幼蟲的食草，葉片、樹幹汁液當防蚊外敷藥，可治皮膚病、癩瘋病，因翅果具有強大傳播力，且低海拔森林生長旺盛，常纏勒原生植被，故在澳洲、夏威夷、佛羅里達、留尼旺、模里西斯等地是百大入侵物種。

偶見假木豆 (*Dendrolobium triangulare*)，希臘學名dendron (樹) 和lobion (突出物) 締造而成，意指蝶形花瓣中的花柱突起狀，又稱千斤菝、野螞蝗、假綠豆、假土豆，葉三出複葉，小葉長5-7公分、寬3-4公分，略大於常見散花山螞蝗、蝙蝠草。根部形成根瘤菌，被廣泛當成綠肥作物，覆蓋土壤防止侵蝕。葉子是琉球三線蝶食草，在印度、緬甸治療痢疾、腹瀉，烤焦葉片治咳嗽，根部增加肌肉或壯陽藥。

相思樹胸圍155公分海拔310公尺 (218520, 2464196)，優勢種植物有綠竹、芒果、內荖子、小梗木薑子、山柚、粗糠柴、血桐、香澤蘭、長穗木、樹杞、稜果榕、假酸漿、過山香、細葉麥門冬、九丁榕、無患子、小葉桑以及軟毛柿。軟毛柿 (*Diospyros eriantha*) 排灣語稱Dazimugan，中國大陸稱烏材柿、包公樹，

猿尾藤

假木豆



過山香

土楠

雖樹皮烏黑，但材質脆裂，僅作薪柴，台北福華公教會館廣植成綠蔭。聚繖花序盛開7月，花冠白色，高腳蝶狀，卵形漿果由綠轉褐色，抽取未成熟果實製成柿漆，供塗雨具、漁網、美濃油紙傘。相傳許仙與白娘子西湖紅傘為媒，演繹千年等一回的動人愛情傳說，油紙傘遂成了愛情忠貞不渝的信物。客家庄客語「紙」與「子」諧音，婚嫁時以兩把紙傘為嫁妝之一，且傘字含有四個人，象徵早生貴子、多子多孫。

相思樹拱門海拔381公尺 (218675, 2464151) 發現土楠族群；土楠 (*Cryptocarya concinna*) 中國大陸稱黃果厚殼桂，分布於海南島、廣西、廣東、貴州東南部荔波、三都、江西、越南。希臘文Cryptos (隱藏) 和caryon (核果) 締造而

成，意指果實全部為增大的花被(花萼與花瓣)癒合成核果，狹橢圓形核果，成熟由綠轉黑色。木材紋理細密，堅固耐用供建築、裝飾、器具、牛車輪使用。

林道常見台灣特有種～台灣山麻桿，台灣山麻桿 (*Alchornea trewioides* var. *formosae*)，中國大陸稱紅背山麻桿，分布福建、廣東、廣西、湖南、海南、江西、四川、雲南、日本琉球、老撾、泰國北部、越南北部；台灣僅見陽明山、彰化楓坑、銀行山。屬名 *Alchornea* 乃紀念英國植物學家斯坦尼斯·阿爾紹恩 (Stanesby Alchorne, 1727-1800)，用其姓締造而成，葉心形，形長9-14公分、寬8-12公分，先端短突尖，齒緣，基部5枚紅色腺體，著生2枚披針形腺毛，雌雄同株，穗狀花序頂生，雄花球形；蒴果扁球形，花柱3裂宿存。其它植物有枯里珍、多花漿果莧、姬牽牛、野棉花、山黃梔、小梗木薑子、馬櫻丹、九芎、串

鼻龍、土密樹、五節芒、絡石、山菜豆，林隙間眺望卡悠峰瀑布潑灑

壯觀。偶見蘿芙木。



台灣山麻桿

台灣山麻桿

光枝多花油柑



毛瓣蝴蝶木



馬櫻丹

425岩峰眺望處海拔419公尺 (218974, 2464306)，相思樹胸圍62公分，左側俯瞰南迴鐵路與枋山溪迴旋曲道。喬木層有紅柴、青剛櫟、細葉鰻頭果、白臼、月橘、武威山枇杷、光枝多花油柑；藤本則有千金藤、菊花木、絨毛芙蓉蘭、山柑、疏花魚藤、蔓鴨舌癩。

廣場岔路海拔444公尺 (219039, 2464340) 左岔425岩峰，右岔直行枋野具山林道，周圍最壯碩是土楠胸圍290公分，續行60公尺，右側抵達枋野巨山攻頂點，海拔438公尺 (219079, 2464327)，指標樹相思樹胸圍165公分，伴生銳葉狀的毛瓣蝴蝶木。毛瓣蝴蝶木 (*Capparis sabbiaefolia*) 中國大陸稱黑葉山柑，分布至1400公尺的泰國、印度、緬甸等地；2004年9月2日，鍾詩文、呂勝由、王志強、謝光普、楊勝任等人共同發表為新紀錄種。本種特徵小枝無刺，葉薄革質，長7.5-10公分，葉脈明顯，葉基圓形，花萼內部密生絨毛。銳葉山柑，小枝有刺，葉長9-16公分，葉基銳形，葉脈不明顯，花萼光滑僅邊緣有絨毛。

攻頂點坡面植物有狗骨仔、薄葉玉心花、絡石、裡白巴豆、盤龍木、猿尾藤、細葉麥門冬、石荇舅、細脈赤楠。順著大象登山隊布條前進，攻頂點至三角點僅400公尺距離，但全是有刺灌叢形成隧道，匍匐前進需花費50分鐘，另登山口至攻頂點則約有2.9公里。6分叉相思樹胸圍242公分，海拔485公尺 (219251, 2464281) 稍作休息。

屏東的山地植群受到東北季風吹襲，形成植被倒伏、匍匐灌叢，其中有刺灌叢植物聚集，組成者有華茜草樹、柘樹、烏柑仔、黃荊、馬櫻丹、小刺山柑，少見魯花樹、刺裸實 (北仲)。小刺山柑 (*Capparis micracantha* var. *henryi*)，是1892年亨利·奧古斯丁來打狗海



小刺山柑



粗糠柴



呂宋青藤

關擔任醫官時採集的植物，亨利是愛爾蘭籍植物學者與漢學專家，對台灣植物研究史有偉大貢獻。學名訂正是松村任三 (Jinzo Matsumura, 1856-1928)，他是東京大學附屬小石川植物園第一任園長，為染井吉野櫻、山葵加上拉丁學名。1893年亨利亦採集到在本休息區可見的台灣刺蕊草 (*Pogostemon formosanus*)，本種的採集地點是高雄猴山 (Ape's Hill) 與屏東萬金庄 (Bankinsing)。小刺山柑葉子提供端紅粉蝶、黑點粉蝶、雌白黃蝶、台灣粉蝶、淡紫粉蝶、斑粉蝶幼蟲的食草，匍匐前進卻發現輕盈大笨蝶 (大白斑蝶) 穿梭飛舞，可能是被鷓鴣或絨毛芙蓉蘭吸引。

枋野具山三角點海拔 486(483)公尺 (219262, 2464267) 屬相思樹植物社會 ——

台灣省政府圖根補點373號，三角基點無視野，必須往前至崩崖，近眺枋山溪流，遠觀由左至右分別為~中心崙山、里龍山、里龍下山、竹坑山等遠近山巒美景。指標樹九芎胸圍225公分、相思樹130公分。其它優勢植物有過山香、金午時花、水竹葉、粗糠柴、九芎、扛香藤、山素英、土密樹、小芽新木薑子、內荖子、高雄卷柏、箭葉鳳尾蕨、鐵線蕨、恆春山藥、細葉麥門冬、三角葉西番蓮、串鼻龍、九節木、樹杞、白雞油、白花草、海州常山、糯米團、毛瓣蝴蝶木、海金沙等。

卡悠峰瀑布海拔187公尺 (218980, 2466019) 屬相思樹植物社會 ——

停車場內有民國96年6月內政部土地測量局三等控制點T222。登山口種植常見黑板樹、棟、台灣欒樹、龍眼、保留蟲屎、台灣白匏子、山黃梔、海州常山、七日暈。眺望台海拔264公尺 (219084, 2466414)，早期稱為內獅瀑布，排灣族語稱「瓜哩丟」意指懸崖之意，是枋山溪上游阿士文溪的源頭，在豐水期時，是枋寮以南最雄偉的瀑布，高約40公尺，扇形而下，至深潭前又再一層瀑布。憑欄眺望，巨瀑似布似帛傾瀉而下，洶湧澎湃，氣勢磅礴，美不勝收。

卡悠峰瀑布眺望台植物，優勢種為呂宋青藤 (*Illigera luzonensis*)，屬名青藤屬，乃是紀念德國曾編著植物學術語的昆蟲家約翰·卡爾·威廉·伊利格 (Johann Karl Wilhelm Illiger, 1775-1813)，用其姓締造而成。另以鞍背檉柳



卡悠峰瀑布是枋山溪上游阿士文溪的源頭

猴、藍翅金剛鸚鵡紀念命名。腋生聚繖花序，粉紅色，花被片2輪共10枚，翅果展開如一隻綠色蝴蝶。本種是燕鳳蝶 (*Lamproptera curius*) 的食草，大仁科技大學分析呂宋青藤，發現其具有5種生物鹼 (aporphine alkaloids)，對心血管具有初步作用。

伴生種有光枝多花油柑、青芋麻、山芙蓉、龍眼、銀合歡、紅毛粉藤、海金沙、扛香藤、血桐、榕、密花芋麻、水雞油、月橘、台灣魔芋、翼核木、角花烏斂莓、雞屎藤、香澤蘭、威靈仙、天花、姬牽牛。偶見欖仁舅 (*Neonauclea reticulata*)，頂生球形頭狀花序，白花，花柱細長伸出冠筒，讓人聯想冠狀病毒圖案～嚴重特殊傳染性肺炎，最新109年8月通報確診病例，台灣已確診為488人，全世界近2463萬人；死亡人數台灣7人，全世界死亡83.5萬人，群聚感染，疫情嚴重爆發肆虐全球。欖仁「舅」意指葉形似欖仁，又稱海木杏，因生長在海濱如「蒼蒼竹林寺，杳杳鐘聲晚」。其木材是蘭嶼達悟族拼板舟的船首、船尾板、坐墊、舵架、船槳、織布機上的刀狀打棒與梭子；樹皮是藤甲之背心內襯。

巴層巴墨山登山口海拔97公尺 (221252, 2464484) 屬銀合歡植物社會

台1線南下452.25公里處左轉，從枋山觀光農園的牌樓進入，4公里往卡悠峰瀑布，10.2公里林務局出入登記處，10.6公里巴層巴墨山南稜登山口。銀合歡胸圍21公分，因根系含有含羞草素，形成單一純林，但後段山脊卻是黃荊林，丈量胸圍約26公分，分蘖多枝，不畏銀合歡排他性毒素。地被常見植物有腺果藤、紫花藿香薊、扛香藤、毛西番蓮、恆春厚殼樹、猿尾藤、金午時花、姬牽牛、過山香、馬櫻丹、鐵牛入石、耳葉鴨跖草、海金沙、土

密樹、香澤蘭、山素英、鞭葉鐵線蕨、台灣鱗球花、白花草、絡石，順著長花九頭獅子草 (*Peristrophe roxburghiana*) 形成路徑，踏著粉紅色地毯前進。

巨木黃連木胸圍196公分，海拔302公尺 (221228, 2464956)，伴生山黃梔、小刺山柑、腺果藤、過山香、扛香藤、七日暈、九芎、月橘、刺裸實、銀合歡、鷓鴣蔓、內芎子、無患子、粗糠柴、香澤蘭、烏面馬、細葉饅頭果。偶見雞母珠 (*Abrus precatorius*)，種子紅黑相間如孔雀豆「紅豆生南國，春來發幾枝，願君多采擷，此物最相思。」種子意為相思卻含雞母珠毒蛋白，與間諜使用蓖麻毒素雷同，中毒者會嘔吐、發燒、出血、循環衰竭致死，成人約攝食0.5mg或吸入0.24mg毒蛋白就有致死危險。

崩壁區海拔333公尺 (221206, 2464988)，下方枋野名樹～黃連木胸圍201公分，近俯瞰南迴鐵路、枋野車站、枋山溪蜿蜒西瓜田，遠瞰草埔後山、阿耶美須山、中心崙山、里龍山、竹坑山連稜，此地景如同台灣山岳2019年141期雜誌封面圖，主題「爬上山巔只為展



枋野名樹～黃連木胸圍201公分



俯瞰南迴鐵路、枋野車站、枋山溪蜿蜒西瓜田，遠瞰中心崙山、里龍山、竹坑山連稜

望，動感火車呼嘯風景」。有名西瓜河賞景期限定2月前。恆春半島落山風讓富寶二號大西瓜抗病毒CMV，成熟期早，肉質鮮紅耐貯運，風味脆嫩多汁。恆春古城三怪是落山風、檳榔、思想起；三寶則是洋蔥、瓊麻、西瓜。產區因土質環境不同，最早的冬季西瓜是恆春、四重溪，再來是楓港、枋山溪。

乾旱地崩坡常見車桑子 (*Dodonaea viscosa*) 屬名是紀念荷蘭皇家醫生、草藥學家倫伯特·多登斯 (Rembert Dodoens, 1518-1585) 用其姓締造而成，他在1554年撰寫「Cruydeboeck」植物標本書籍，是繼聖經之後翻譯最多的書籍。本種適合作海岸防風林、綠籬美化；全株含有氫氰酸、生物鹼、皂苷，誤食會引起腹瀉；外用止癢，燻蒸治風濕病；毛利人利用樹葉、種子製成特殊香水，翅狀蒴果替代啤酒花和酵母來釀造啤酒。

欖仁鼻

耳葉鴨跖草



車桑子

富寶2號西瓜



大葉雀榕巨木，胸圍437公分



大葉雀榕

穿越九芎綠隧道至大葉雀榕巨木。大葉雀榕巨木海拔437公尺(221051, 2465351)胸圍437公分，其氣生根發達具纏勒絞殺現象，是森林中的流氓。其它較粗壯者有朴樹122公分、相思樹102公分，伴生種山黃梔、小芽新木薑子、絨毛芙蓉蘭、扛香藤、烏柑仔、假酸漿、武靴藤、黃荊、密花白飯樹、過山香、天門冬、疏花魚藤、台灣海桐，偶見月橘枝幹蛇狀扭曲，丈量胸圍76公分，花香四溢瀰漫，「月窟飛來露已涼，斷無塵格惹蜂黃。纖纖綠裏排金粟，何處能容九里香。」

榔榆植群海拔560公尺(221074, 2465617)胸圍80公分，屬拉繩陸上稜線山徑。稜線岩石陡峭，貧脊土壤卻見巨木～小葉朴，胸圍162公分，海拔611公尺(221119, 2465698)。小葉朴與沙楠子樹相似，兩者葉形皆有掌狀3出脈，惟後者葉端燕尾尖。其它地被植物有槍刀草、假酸漿、土密樹、烏面馬、長花九頭獅子草、內荖子、山柚、台灣鱗球花、三角葉西番蓮、

鐵線蕨、鳳尾蕨以及原產非洲熱帶地區的落地生根，不知何方神聖將它帶至乾旱森林，或許如同別名「打不死」外號，葉緣鋸齒飄落地能生根發芽。

櫟樹門海拔677公尺(221040, 2465902)，丈量左邊136公分、右邊286公分，前面榔榆則是160公分，此處高點可眺望台灣海峽美景。發現山埔姜與武威山枇杷(*Eriobotrya deflexa* f. *buisanensis*)林立，武威山枇杷葉端銳形，長9-14公分、寬1.5-2公分；恆春山枇杷則葉端鈍頭，長7-14公分、寬3-6公分。偶見石頭縫隙長滿石蟬草(紅莖椒草)，葉肉肥厚，背鮮豔奪目如同紅椒草，實際可推廣為原生多肉植物栽種觀賞。

九芎崖薑蕨海拔805公尺(220840, 2466272)指標樹猶如九芎巨木手捧一束崖薑蕨，在山徑邊為登山客喝采！陳百強歌詞「路上我願給你輕輕扶，你會使我感到好驕傲，幸福歡樂陪著你去找一生美好，將一聲聲嘆息，化作生命力。」稜線植物有樟葉槭、內荖子、白孢子、鐵雨傘、山黃梔、山柚、十子木、桶鉤藤、台灣山桂花、細葉饅頭果、樹杞、細脈赤楠、山菜豆、珊瑚樹、烏來冬青和胸圍232公分的相思樹。眺望平台海拔856公尺(220685, 2466328)近俯枋山溪S狀侵蝕、切割、隆起形成河階曲流；遠瞰由左至右：耆路知可山、草埔後山、牡丹山、埤亦山、女仍山、萬里得山、豬老東山、老佛山、中心崙山、里龍山等連稜山巒。



石蟬草，又名紅莖椒草，葉肉肥厚



紅椒草



崖薑蕨



樺樹門海拔677公尺，丈量左株胸圍136，右株286公分

巴層巴墨山海拔947(937)公尺(220603, 2466497)屬內荖子植物社會

山字森林三角點，山頭獨特聳立，視野一級棒，有360度高級展望，與里龍山相比毫不遜色。站在突起石敢當岩石遠眺南湖呂山、北大武山、大漢山、馬羅寺山、姑子崙山、茶茶牙頓山、茄芝萊山，近瞰825峰東側雄偉岩壁遙看碧藍的台灣海峽。三角點無喬木，僅見入口端相思樹倒伏胸圍71公分、魯花樹130公分、大葉溲疏分蘖多枝170公分。其它常見灌叢植物有鐵雨傘、雞血藤、台灣懸鉤子、內荖子、雀梅藤、香澤蘭、台灣刺蕊草、柘樹、刺果衛矛、烏面馬、串鼻龍、咸豐草、楓香、台灣山桂花、杜虹花、小花蔓澤蘭、台灣蘆竹、九節木和盛開略有芳香的海州常山，偶見屏東鐵線蓮。

枋野車站海拔135公尺，位於屏東縣獅子鄉枋山車站與中央號誌站間，距離枋寮端20.5公里，聯外道路已解編鄉道屏147-1線9.8公里處。1992(81)年7月營運未設立月台屬南迴秘境車站，主要功能負責列車的待避或交會，掌控枋野二號橋風速監視儀，通知列車減速避開強勁的落山風。正前方眺望825山峰與巴層巴墨山兩座氣勢磅礴的山容。

枋山車站1992年10月5日啓用，是台灣最南端鐵路車站，距離枋寮端13.6公里、內獅14.9公里，前方枋山一號隧道具有島式月台、側式月台各一座，是一個簡易車站。屏147-1線0.7公里處，順著愛文芒果田遙看蔚藍大海或是注視紅如烈火、橙如楓葉、夕陽落日景觀。枋山車站左右門神是龍柏，栽種茄苳、榕、月橘、鵝掌藤、厚殼樹、木麻黃、楓香、銀合歡、矮仙丹。

枋山車站，是台灣最南端的鐵路車站



遙望愛文芒果田中的枋山車站

內獅車站海拔23公尺，位於加祿村南和路43號，台1線447處臨內獅國小，距離枋寮端加祿3.4公里、枋山4公里，1992年啓用，1993年降為招呼站，因每日運量僅1人左右，未來台鐵計畫變成恆春轉運站，直通新左營車站。車站主體以中國宮廷風格設計，如斜屋頂、樑柱、瓦當、雨簾、神獸、斗拱等符合內獅古樸地名。車站植物有欖仁、榕樹、小葉欖仁、蒲葵、矮仙丹、小葉桑、鳳梨、椰子、皇冠龍舌蘭、恆春厚殼樹、稜果榕、虎尾蘭、變葉木等。



士文部落的入口牌樓

舊古華部落是1931年日據時代，位於北湖呂山的兩個部落～Kuabar(割肉社)、Tjairarak(大茅社)合併而成，日警爲了理蕃方便強迫遷村至屏144-1古華社區。依據台灣原住民資訊網，士文部落(Seveng)是由卡士奉案、古拉扯奧、籃併、丹列、普及部當、爪里奴姑子等諸社合併譯名，入口牌樓是象徵太陽神貴族的陶壺以及守護族人的百步蛇。春日之歌「七佳 歸崇 力里 大漢山下的子民/春日 古華 士文 坐落北湖呂山/搖曳的小米成熟的芒果 還有那芋頭田/全都來自卡蘇卡古/一拉一撒茲卡 歐海洋/可愛部落兩個太陽(春日)/Yeah～喔乎/一拉一撒茲卡～～/喔喔喔～我們就在春日鄉/馬撒嚕阿瑪不拉～」。

左邊是二葉松老樹古華國小士文分校，右邊是天主堂與基督長老教會，庭前栽種欖仁樹供乘涼。其它常見植物有樟、黑板樹、萬金葛、鳳凰樹、仙丹花、聖誕紅、萬年青、枯里珍、假酸漿、孤挺花、桂花、青楓、榕、竹、朱蕉、山蘇、黃椰子。

北湖呂山停車場海拔663公尺 (216433, 2472928) 屬相思樹植物社會

停車處位於士文1號農路與古華岔路口，春日鄉第15任鄉長陳昭忠豎牌昭示，因莫拉克風災，經由高金素梅立委、國台辦、大陸海協會善款建設千瘡百孔農路。指標樹相思樹胸圍87公分、白雞油107公分。常見植物有山刈葉 (*Melicope semecarpifolia*)，屬名由meli(蜂蜜)和kope(部分)締造而成，意指其子房基部帶有蜂蜜物質的腺體；故是大琉璃紋鳳蝶的食草，觀察由卵、幼蟲、蛹、成蟲完全變態飼養約40日。其它植物有內芩子、鵝掌柴、米碎柃木、山柚、銀合歡、杜虹花、細葉饅頭果、大葉溲疏、山棕、香楠、珊瑚樹、香澤蘭、山漆、山葛、九節木、山枇杷、五節芒、台灣山桂花、三葉崖爬藤、七日暈、馬櫻丹，偶見台灣白匏子以鮮嫩紅葉，含有露水，讓人憶及宋代晏幾道的《思遠人·紅葉黃花秋意晚》「紅葉黃花秋意晚，千里念行客。飛雲過盡，歸鴻無信，何處寄書得，淚彈不盡臨窗滴。」

藍色工寮海拔710公尺 (217177, 2473056) 附有春日鄉公所遺址及生態維護隊巡邏箱，指標樹香楠胸圍70公分、山黃麻118公分。常見植物川上氏月桃 (*Alpinia kawakamii*)，1907年4月，由川上瀧彌在台東廳 (Taito) 與璞石閣 (Bokusekikaku, 玉里) 發現，早田文藏博士發表。其它另有假酸漿、美人蕉、虎克氏鱗毛



枯里珍



台灣白匏子鮮豔的紅葉



山素英

蕨、台灣黃堇、牛奶榕、串鼻龍、角花烏斂莓、山芙蓉、冇骨消、天門冬、野桐、大葉楠、土牛膝、猿尾藤、火炭母草、密花芋麻、昭和草、長穗木、大花咸豐草。

指標樹九芎肚中有青剛櫟，海拔761公尺(217061,2472898)，丈量胸圍九芎149公分、青剛櫟61公分。樹梢有台灣藍鵲嘎嘎叫，灌叢則有純白山素英點綴樹冠。空隙間眺望巴層巴墨山、四林格山、老佛山、里龍山、竹坑山。崖溝海拔910公尺(217775,247316)整片相思林，地被有細葉麥門冬、糯米團、長穗木、糙葉菝葜、薄葉蜘蛛抱蛋、落地生根、山黃皮以及布烈氏黃芩。布烈氏黃芩(*Scutellaria playfairi*)，是為紀念喬治·麥克唐納·布烈氏(George Macdonald Home Playfair, 1850-1917)，1877與1888年，布烈氏曾任台灣府英國代理領事，發現山豆根、台灣鐵線蓮、小葉朴、台灣蔗草及布烈氏黃芩。台灣土沉香整片，海拔924公尺(217863,2473161)，伴生台灣刺蕊

草、小杜若、田代氏澤蘭、台灣馬兜鈴、天門冬、桔梗蘭、呂宋莢蒾。

休息區海拔968公尺(218065,2473265)，指標樹相思樹丈量胸圍200公分，附生崖薑蕨及一個煮熱水的鍋具，長124公分，猜想當初是有人聚集之處。廣場種植的白雞油形成密林，優勢種有樟葉楓、樟樹、屏東木薑子、鵝掌柴、細葉饅頭果、小梗木薑子、朴樹、台灣肉桂、台灣赤楠、台灣欒樹。地被有野棉花、火炭母草、山柑、毛瓣蝴蝶木、絡石、絨毛芙蓉蘭、長花九頭獅子草、菊花木及亨利氏伊立基藤。

溪溝海拔1060公尺(217949,2473415)，遇見恆春特有植物有武威山枇杷、恆春石斑木、港口木荷、楊桐葉灰木、台灣蕘花以及二種殼斗科植物小西氏石櫟、三斗石櫟。展望台海拔1135公尺(218275,2473528)，由左至右眺望南湖呂山、草埔後山、女仍山、四林格山、中心崙山、老佛山、里龍山、竹坑山、外獅頭山等綿延山巒。



川上氏月桃



布烈氏黃芩



呂宋莢蒾

稜線段海拔1183公尺(218583,2473801)，喬木層有台東石櫟、紅葉樹、短尾葉石櫟、黃杞、長葉木薑子、橢圓葉赤楠、香葉樹。地被則是單一的薄葉蜘蛛抱蛋與冷清草。指標樹錐果櫟海拔1203公尺(218641,2473820)，胸圍160公分，伴生種有樹杞、琉球雞屎樹、香桂、華八仙、長葉木薑子、鬼紗羅、狗骨仔、大葉木犀、紅楠、華東瓶蕨、細柄雙蓋蕨、紅柄鳳尾蕨、早田氏鼠尾草、根節蘭等。

海拔1251公尺可眺望枋寮港、大鵬灣、台灣海峽。指標樹錐果櫟海拔1279公尺(218817,2473822)，胸圍123公分。橫倒枯木有恆春福木(*Garcinia multiflora*)，葉外型如蘭嶼福木，恆春福木葉倒卵形，長7-15公分、寬2.5-6公分，先端端圓，下表面側脈明顯，果熟呈橘黃色如福木；蘭嶼福木，葉橢圓形，長7.5-12公分、寬4-6.3公分，先端凸尖，下表面側脈不明顯，果黑熟如山竹模樣。

稜線出現眾多南仁山栲、鐵冬青、小葉木犀、尾葉山茶、楊桐葉灰木、紅淡比、九節木、米碎枱木以及桃葉珊瑚鮮果點綴鬱蔥盤根錯節林海。保安水泥柱海拔1335公尺(219086,2473802)，植物有瓊楠、阿里山灰木、台灣錐花、長葉木薑子以及恆春半島少見的玉山糯米樹(*Viburnum*

integrifolium)。

桃葉珊瑚



恆春福木



恆春賽衛矛



盛產於南仁山的日本賽衛矛

北湖呂山海拔1370(1357)公尺(219134,2473933)屬錐果櫟植物社會

三等三角點4252號，三角點無展望，掛有南無阿彌陀佛，與青山綠水任我遊，登頂喜悅在心頭，勉勵強心脾。優勢種恆春賽衛矛(*Microtropis matsudai*)，葉卵狀披針形長7-8公分、寬1.5-4.5公分，先端尾狀漸尖，與盛產於南仁山的日本賽衛矛非常雷同，卵狀披針或菱形葉，長6-10公分、寬2-5公分，葉端銳尖或微凹。另一種佐佐木氏木薑子(*Litsea akoensis* var. *sasakii*)是屏東木薑子的狹葉變種，又名「浸水營木薑子」，葉背具有柔軟黃褐柔毛；1921年10月佐佐木舜一(Syuniti Sasaki, 1888-1960)在浸水營發現，學名由上河內靜發表。

指標樹錐果櫟胸圍244公分，板根6支。三角點植物有石荅舅、尾葉山茶、小芽新木薑子、九節木、細葉麥門冬、細葉鰻頭果、狗骨仔、樹杞、烏來冬青、紅楠、細脈赤楠、小西氏石櫟、台灣肉桂、台灣楊桐、燈稱花、台灣糊樗、鵝掌柴、奧氏虎皮楠、短尾葉石櫟、厚皮香、山香圓、華八仙、南仁新木薑子。地被有紅果苔、紅柄鳳尾蕨、烏來麻、虎克氏鱗蓋蕨、伏牛花、台灣土沉香、山月桃、台灣崖爬藤、台灣絡石、冷清草、台灣魔芋及太麻里山蛩等。